

**Die Konstanten
der
physischen Libration des Mondes
berechnet aus Kasaner Heliometermessungen.**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der philosophischen Doktorwürde

der hohen

Philosophischen Fakultät der Königl. Universität Breslau

eingereicht

und mit ihrer Genehmigung veröffentlicht

von

Max Völkel.

Sonnabend, den 13. Oktober 1906, mittags 12 Uhr


in der Aula Leopoldina:

Vortrag

Über die Vorzüge der photographischen und helio-
metrischen Messung zur Ortsbestimmung von Himmels-
körpern

und

Promotion.



Breslau
Buchdruckerei H. Fleischmann
1906.

Gedruckt mit Genehmigung der hohen philosophischen Fakultät
der Kgl. Universität Breslau.

Referent: Prof. Dr. **Franz.**

Seinem lieben Lehrer

Herrn Professor Dr. Franz

in aufrichtiger Dankbarkeit

gewidmet.

1. Einleitung.

Vorliegende Arbeit ist eine Reduktion von heliometrischen Anschlüssen des Kraters Mösting A an den Mondrand, die in Kasan in der Zeit vom Mai 1898 bis zum April 1904 zum Zweck der Bestimmung der Librationskonstanten ausgeführt wurden. Eine Kopie der Originalmessungen wurde von dem Direktor der Kasaner Sternwarte Herrn Prof. Dubiago, der hiesigen Sternwarte übersandt, worauf mir von Herrn Prof. Franz die Bearbeitung übertragen wurde. Die Untersuchung der physischen Libration des Mondes ist eine der interessantesten, aber auch eine der schwierigsten Fragen der Astronomie, und zwar liegt die Schwierigkeit weniger in dem theoretischen Teile, als vielmehr in der praktischen Durchführung der Aufgabe. Denn einmal sind die zu bestimmenden Librationsgrössen äusserst klein, andererseits aber müssen die der Rechnung zugrunde liegenden Messungen naturgemäss mit grosser Unsicherheit behaftet sein, da es sich hierbei um Messungen der Distanz eines Objektes der Mondoberfläche von dem mitunter recht unebenen Mondrande handelt. Aus diesem Grunde kann ein abschliessendes Urteil über die Rotationselemente des Mondes erst aus der Vergleichung mehrerer möglichst genauer und reichhaltiger Beobachtungsreihen gewonnen werden, und man kann sich nicht wundern, wenn die bisher erhaltenen Resultate teilweise recht erheblich von einander abweichen. Die beiden letzten und wichtigsten Arbeiten auf diesem Gebiete der Selenographie sind die Reduktion der Schlüterschen Heliometermessungen zu Königsberg durch Herrn Prof. Franz, sowie eine kürzlich erschienene

Abhandlung von Herrn F. Hayn in Leipzig. Der im folgenden ausgeführte theoretische Teil stützt sich im wesentlichen auf die beiden letztgenannten Autoren.

Es mag mir gestattet sein, an dieser Stelle Herrn Prof. J. Franz für das freundliche Interesse, mit dem er stets meine Arbeit gefördert hat, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen. Auch Herrn F. Hayn, der mir bereitwilligst seine Arbeit zur Verfügung stellte, sowie Herrn Dr. Rechenberg, Assistent an der hiesigen Sternwarte, der in liebenswürdiger Weise gegen Schluss der Arbeit einen Teil der zeitraubenden Kontrollrechnungen übernahm, bin ich zu grossem Danke verpflichtet.

Der Uebersichtlichkeit halber habe ich die folgende Untersuchung in drei Hauptabschnitte zerlegt. Im ersten soll eine kurze Uebersicht über die angewandte Theorie gegeben werden, der zweite enthält die Herleitung der Instrumentalkonstanten, der dritte die Bestimmung der Librationskonstanten.

I. Teil.

2. Die Theorie der Libration gründet sich auf die drei von Cassini zuerst ausgesprochenen Gesetze über die Rotation des Mondes:

a. Die Rotation des Mondes ist gleichförmig und gleich seiner Umlaufszeit um die Erde.

b. Die Neigung der Rotationsachse gegen die Ekliptik ist konstant.

c. Die Ebenen von Mondäquator, Mondbahn und Ekliptik schneiden sich in einer Graden, und zwar fällt der absteigende Knoten des Mondäquators mit dem aufsteigenden Knoten der Bahn zusammen.

Wenn also der Mond eine homogene Kugel wäre, und wenn er sich in einer mit seiner Aequatorebene zusammenfallenden Kreisbahn um die Erde bewegte, so würde nach den Cassinischen Gesetzen stets ein und derselbe Mondradius nach dem Erdzentrum hinweisen, mit anderen Worten, die Verbindungslinie der Schwerpunkte von Mond und Erde

würde immer durch denselben Punkt der Mondoberfläche gehen; wir würden also vom Erdzentrum aus immer genau dieselbe Halbkugelfläche des Mondes übersehen.

3. Die Tatsache, dass die soeben vorausgesetzten Bedingungen nicht erfüllt sind, verursacht die Libration. Da nämlich die Bahngeschwindigkeit des Mondes wegen seiner elliptischen Bewegung nicht konstant ist, so wird bei gleichförmiger Rotation ein Punkt der Mondoberfläche relativ zur Erde bald voraneilen, bald zurückbleiben; ebenso wird sich der Mond wegen seiner wenn auch geringen Bahneigung aus der Ebene der Ekliptik herausbewegen. Diese Unregelmässigkeiten, die sich, von der Erde aus gesehen, durch teilweises Hervortreten von sonst unsichtbaren, auf der abgewendeten Mondseite liegenden Randpartien bemerkbar machen, nennt man die optische Libration des Mondes. Diese Art der Libration würde, an sich betrachtet, die strenge Gültigkeit der Cassinischen Gesetze nicht in Frage stellen; sie ist, worauf schon ihre Benennung hindeuten soll, keine reelle, sondern nur eine scheinbare Schwankung des Mondes, die nur von seinen Bahnelementen abhängt und mit diesen zugleich bekannt ist.

4. Macht man aber die Annahme, dass die Figur des Mondes von der homogenen Kugel abweicht, so stellen sich die Verhältnisse wesentlich anders. Diese Annahme aber erscheint von vornherein berechtigt. Vom Standpunkte der Kant-Laplace'schen Theorie aus kann man sich vorstellen, dass in einer früheren Entwicklungsperiode des Mondes, in der seine Masse noch nachgiebiger war, durch die bedeutende Anziehung der nahen Erde eine Flutwelle aufgeworfen wurde, während er sich unter der Einwirkung von zentrifugalen Kräften an den Polen abplattete. Da nun durch die Flutreibung die Rotation des Mondes verlangsamt werden musste, bis er relativ gegen die Erde in Ruhe kam, so folgt, dass er nach seiner Erstarrung die Form eines dreiachsigen Ellipsoides angenommen haben muss, wenn auch nicht geometrisch, so doch in seiner Massenverteilung. Auf die Flutreibung werde ich weiter unten noch einmal

zu sprechen kommen. Bei einer solchen Massenverteilung aber können bei der elliptischen und gegen die Ekliptik geneigten Bahnbewegung die Cassinischen Gesetze nicht mehr in aller Strenge bestehen. Die Gleichgewichtslage des Mondes gegen die Erde wird durch die optische Libration fortwährend gestört. Da aber diese Lage naturgemäss stabil ist, so müssen offenbar Kräfte auftreten, die sowohl auf die gleichförmige Rotation, wie auf die konstante Richtung der Rotationsachse einen störenden Einfluss haben. Die so definierten Schwankungen bilden die physische Libration, und zwar speziell die nach Herrn Prof. Franz sogenannte erzwungene physische Libration, weil sie unter den tatsächlich vorliegenden Verhältnissen vorhanden sein muss. Möglich wäre noch eine andere Schwankung, die willkürliche physische Libration. Wie schon erwähnt, wurde wahrscheinlich durch die Flutreibung die Rotation des Mondes allmählich verzögert; in einem bestimmten Zeitpunkt musste dann die Rotation in eine pendelartig schwingende Bewegung übergehen, deren Amplitude immer weiter abnahm. Sollte nun der Mond vollständig erstarrt sein, ehe diese Schwingung ganz erloschen war, so musste sie von da an unverändert erhalten bleiben. Die bisherigen Beobachtungen scheinen aber darauf hinzudeuten, dass diese willkürliche Libration in der Tat nicht vorhanden ist oder wenigstens durch die jetzigen Messungsmethoden nicht nachgewiesen werden kann.

5. Es handelt sich nun um die mathematische Formulierung des Problems. Selenozentrisch betrachtet und auf ein selenozentrisches Coordinatensystem bezogen, stellt sich die Libration als eine periodische Bewegung des Erdzentrums um eine mittlere Lage dar. Als Coordinatenachsen definieren wir nach den vorangeschickten Erörterungen über die Massenverteilung die drei Hauptträgheitsachsen des Mondes wie folgt: Als X-Achse nehmen wir den von Mädler sogenannten „ersten“ Radius, positiv nach der Erde zu; als Y-Achse die auf der vorigen senkrechte Richtung der Bahntangente, positiv entgegengesetzt der Bahnbewegung; als Z-Achse die Rotationsachse, positiv nach Norden zu.

Ferner nehmen wir A, B, C die auf diese Achsen bezogenen Hauptträgheitsmomente des Mondes, p, q, r die Componenten der Winkelgeschwindigkeiten um diese drei Achsen, x, y, z die Coordinaten der Erde, x', y', z' die Coordinaten eines Mondmassentheilchens dm und V die Kräftefunktion; dann bestimmt sich die Bewegung des Mondes um seinen Schwerpunkt durch die Eulerschen Differentialgleichungen

$$\begin{aligned} & \text{A. } \frac{dp}{dt} + (C-B) qr = z \cdot \frac{\partial V}{\partial y} - y \cdot \frac{\partial V}{\partial z} \\ 1) \quad & \text{B. } \frac{dq}{dt} + (A-C) rp = x \cdot \frac{\partial V}{\partial z} - z \cdot \frac{\partial V}{\partial x} \\ & \text{C. } \frac{dr}{dt} + (B-A) pq = y \cdot \frac{\partial V}{\partial x} - x \cdot \frac{\partial V}{\partial y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hierin ist } V &= M \int [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{-\frac{1}{2}} dm \\ &= M \int [r^2 - 2(xx' + yy' + zz') + r'^2]^{-\frac{1}{2}} dm \end{aligned}$$

wo M die Masse der Erde, r ihre Entfernung vom Mondschwerpunkt und r' die Entfernung des Massentheilchens dm vom Mondschwerpunkt bedeutet.

Um die Differentialquotienten auf der rechten Seite der Gleichungen 1) zu berechnen, entwickelt man V unter Vernachlässigung der dritten und höheren Potenzen von $\frac{r}{R}$ in eine Reihe. Beachtet man dabei die durch die Einführung des speziellen, auf den Schwerpunkt bezogenen Koordinatensystems bedingten Beziehungen der einzelnen Integrale, so gehen die Gleichungen 1) über in

$$\begin{aligned} & \text{A. } \frac{dp}{dt} + (C-B) qr = 3(C-B)M r^{-5}yz \\ 2) \quad & \text{B. } \frac{dq}{dt} + (A-C) rp = 3(A-C)M r^{-5}zx \\ & \text{C. } \frac{dr}{dt} + (B-A) pq = 3(B-A)M r^{-5}xy \end{aligned}$$

Setzt man noch $\frac{C-B}{A} = \alpha$, $\frac{C-A}{B} = \beta$, $\frac{B-A}{C} = \gamma$, so

erhält man

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dt} + \alpha q r &= 3 M \alpha r^{-5} y z = 3 M \alpha . P \\ 3) \quad \frac{dq}{dt} - \beta r p &= - 3 M \beta r^{-5} z x = 3 M \beta . Q \\ \frac{dr}{dt} + \gamma p q &= 3 M \gamma r^{-5} x y = 3 M \gamma . R \end{aligned}$$

wo die Grössen P, Q, R nur als Abkürzungen zu verstehen sind.

Es muss noch gezeigt werden, wie aus den Komponenten der Winkelgeschwindigkeit p, q, r die physische Libration, also die Abweichung der Rotationsbewegung von den Cassinischen Gesetzen gefunden wird. Es sei

- m die mittlere Länge des Mondes
- n die Länge des aufsteigenden Knotens der Mondbahn auf der Ekliptik
- i die Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik
- I die mittlere Neigung des Mondäquators gegen die Ekliptik
- ϑ die wahre Neigung des Mondäquators gegen die Ekliptik
- ψ die Länge des absteigenden Knotens des Mondäquators auf der Ekliptik
- φ der Winkel, den die Richtung der positiven X-Achse mit dem absteigenden Knoten des Mondäquators bildet.

Nennt man ferner die Libration in Länge u, die in Neigung w'' und die in Knoten w, dann bestehen die Beziehungen

$$\begin{aligned} \vartheta &= I + w'' \\ 4) \quad \psi &= n + w \\ \varphi &= 180^\circ + (m + u) - (n + w). \end{aligned}$$

Die Librationsglieder u, w, w'' sind dann mit den Winkelgeschwindigkeiten p, q, r implizit durch die folgenden Gleichungen verbunden

$$\begin{aligned}
 p &= -\sin \varphi \sin \vartheta \frac{d\phi}{dt} - \cos \varphi \frac{d\vartheta}{dt} \\
 5) \quad q &= -\cos \varphi \sin \vartheta \frac{d\phi}{dt} + \sin \varphi \frac{d\vartheta}{dt} \\
 r &= \cos \vartheta \frac{d\phi}{dt} + \frac{d\varphi}{dt}
 \end{aligned}$$

Um die Gleichungen 3) zu integrieren, müssen zunächst die Grössen P, Q, R in eine für die Berechnung brauchbare Form gebracht werden. Die darin auftretenden Koordinaten der Erde x, y, z beziehen sich auf das System der Hauptträgheitsachsen des Mondes; sie lassen sich aber leicht mit Hilfe der Winkel ϑ, ϕ, φ auf das System der Ekliptik transformieren und sich demgemäss durch Radius Vector, Länge und Breite des Mondes ausdrücken.

6. Ich möchte hier den Unterschied erwähnen, der an dieser Stelle zwischen den Untersuchungen der Herren J. Franz und F. Hayn besteht. Franz hat bei der Entwicklung von Länge, Breite und Radius Vector des Mondes nur die Hauptungleichheiten der Bahn berücksichtigt, ferner ersetzt er die Winkel ϑ, ϕ, φ durch ihre Werte aus 4) unter Vernachlässigung der Librationsglieder. Nach Hayn sollen nun diese Vernachlässigungen in beiden Fällen nicht statthaft sein. Es zeigt sich allerdings, dass bei einer weitergehenden Berücksichtigung der Ungleichheiten die Koeffizienten der Libration etwas geändert werden, jedoch so wenig, dass die Sicherheit des Resultates dadurch kaum beeinflusst werden kann. Die grösste Aenderung erfährt das Glied, welches zum Argument den doppelten Abstand des Mondperigäums vom aufsteigenden Knoten der Mondbahn hat; die Aenderung des Koeffizienten wird geozentrisch etwa 0.''18, eine Grösse, die in den Anschlussmessungen des Kraters an den Mondrand wahrscheinlich nicht sehr merklich sein wird. Wichtiger dagegen sind die Vernachlässigungen von u, w, w'' in φ, ϕ, ϑ . Prof. Franz erhält dadurch eine sehr einfache und durchsichtige Integrationsmethode des Gleichungssystems 3). Die dritte

dieser Gleichungen ist leicht integrierbar. Dagegen würde man die beiden ersten, wenn man auf die genannten Vernachlässigungen verzichten wollte, als ein System simultaner Differentialgleichungen zweiter Ordnung zu integrieren haben, während sich im andern Falle zwei Differentialgleichungen erster Ordnung ergeben, die sich leicht nach einander integrieren lassen. Nach Hayn' geschieht nun diese Vereinfachung auf Kosten der Genauigkeit. Vergleicht man aber die Resultate beider Methoden, so zeigt sich, dass die einzige Abweichung in den Ausdrücken für die willkürliche Libration auftritt, die aber, wie bereits erwähnt, für die Messungen unmerklich und daher auch von Hayn selbst späterhin vernachlässigt worden ist. Um nun nachzuweisen, dass die geringen Abweichungen der durch Prof. Franz erhaltenen Librationskoeffizienten von den durch Hayn gefundenen nur wegen der numerischen Vernachlässigungen, nicht aber infolge der angewandten Integrationsmethode vorhanden sind, so habe ich im folgenden die beiden ersten der Gleichungen 3) unter Anwendung der von Hayn entwickelten numerischen Werte nach der von Prof. Franz gegebenen Methode integriert.

7. Nimmt man als Längeneinheit die halbe grosse Achse der Mondbahn, als Zeiteinheit den mittleren Sonnentag und das Massenverhältnis von Mond und Erde gleich $\frac{1}{81}$ an, so wird die Erdmasse M auf Grund des Keplerschen Gesetzes numerisch gleich $0.9877 m'^2$, wo $m' = \frac{dm}{dt}$ die mittlere tägliche Bewegung des Mondes ist. Setzt man noch $M' = 3M$, so erhält man aus 3)

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dt} + \alpha q r &= M' \alpha . P \\ 6) \quad \frac{dq}{dt} - \beta r p &= M' \beta . Q \\ \frac{dr}{dt} + \gamma p q &= M' \gamma . R \end{aligned}$$

Wir wollen zuerst die beiden ersten Gleichungen integrieren und schreiben sie nach Prof. Franz

$$\frac{dp}{dt} + \alpha q r = M' \alpha \cdot \Sigma F \cdot \cos h$$

$$\frac{dq}{dt} - \beta p r = M' \beta \cdot \Sigma G \cdot \sin h$$

oder, da genähert $r = m'$ ist,

$$\frac{dp}{dt} + \alpha m' q = M' \alpha \cdot \Sigma F \cdot \cos h$$

$$\frac{dq}{dt} - \beta m' p = M' \beta \cdot \Sigma G \cdot \sin h$$

Dieses System ist integrierbar und gibt

$$\begin{aligned} p &= \alpha M' \Sigma \frac{h' F + m' \beta G}{h'^2 - \alpha \beta m'^2} \cdot \sin h + c \sqrt{\alpha} \sin (C + \sqrt{\alpha \beta} m' t) \\ 7) \quad q &= -\beta M' \Sigma \frac{h' G + m' \alpha F}{h'^2 - \alpha \beta m'^2} \cos h - c \sqrt{\alpha} \cos (C + \sqrt{\alpha \beta} m' t) \end{aligned}$$

wo $h' = \frac{dh}{dt}$ die tägliche Zunahme des Argumentes h bedeutet. Die letzten Glieder der rechten Seiten, die von den Integrationskonstanten abhängen, stellen offenbar nichts anderes als die willkürliche Libration dar und können deshalb vernachlässigt werden; zudem haben sie eine derartig lange Periode, dass sie, falls c wirklich nicht verschwinden sollte, höchstens eine geringe Aenderung des selenographischen Ortes des gemessenen Kraters bewirken würden.

Wir können also setzen

$$\begin{aligned} p &= + \alpha M' \Sigma \frac{h' F + m' \beta G}{h'^2 - \alpha \beta m'^2} \sin h = \Sigma M \sin h \\ 8) \quad q &= - \beta M' \Sigma \frac{h' G + m' \alpha F}{h'^2 - \alpha \beta m'^2} \cos h = \Sigma N \cos h \end{aligned}$$

Aus 5) folgt, da man $\sin \vartheta = \vartheta$ setzen kann

$$\begin{aligned} \vartheta \frac{d\psi}{dt} &= -p \sin \varphi - q \cos \varphi \\ 9) \quad \frac{d\vartheta}{dt} &= -p \cos \varphi + q \sin \varphi \end{aligned}$$

Da nun $\psi = n + w$, $\varphi = 180^\circ + (m - n) + (u - w)$ ist und $\sin(u - w) = u - w$, $\cos(u - w) = 1$ gesetzt werden kann, so transformieren sich die Gleichungen 9) in

$$\begin{aligned} \vartheta \left(n' + \frac{dw}{dt} \right) &= S + (u - w) T \\ 10) \quad \frac{d\vartheta}{dt} &= T - (u - w) S, \text{ wobei} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= p \sin(m - n) + q \cos(m - n) \\ 11) \quad T &= p \cos(m - n) - q \sin(m - n) \end{aligned}$$

Aus 10) erhält man weiter

$$\begin{aligned} \vartheta \left(n' + \frac{dw}{dt} \right) + w \frac{d\vartheta}{dt} &= [1 - w(u - w)] S - u T \\ 12) \quad \frac{d\vartheta}{dt} - \vartheta w \left(n' + \frac{dw}{dt} \right) &= [1 - w(u - w)] T - u S \end{aligned}$$

wofür man mit Vernachlässigungen von Gliedern höherer Ordnung schreiben kann

$$\begin{aligned} \frac{d(\vartheta w)}{dt} + n' \vartheta &= S \\ 13) \quad \frac{d\vartheta}{dt} - n'(\vartheta w) &= T \end{aligned}$$

Diese Gleichungen sind integrierbar und ergeben mit Berücksichtigung von 11) und 8)

$$\begin{aligned} \vartheta w &= -\Sigma \frac{M - N}{2(m' + h')} \sin(m - n + h) + \Sigma \frac{M + N}{2(m' - h')} \sin(m - n - h) \\ 14) \quad \vartheta &= -\Sigma \frac{M - N}{2(m' + h')} \cos(m - n + h) + \Sigma \frac{M + N}{2(m' - h')} \cos(m - n - h) \end{aligned}$$

wobei wieder aus demselben Grunde wie früher die von den Integrationskonstanten abhängigen Glieder weggelassen sind.

Es ist üblich, noch das Verhältniss $\frac{\alpha}{\beta} = f$ einzuführen; alsdann wird nach der Definition von M und N in 8)

$$15) \quad \frac{M + N}{2 (m' - h')} = \frac{\beta M'}{2} \left[\frac{fF - G}{h' (m' - h')} + \frac{m' \beta f (G - F)}{h'^2 (m' - h')} \right]$$

$$\frac{M - N}{2 (m' + h')} = \frac{\beta M'}{2} \left[\frac{fF + G}{h' (m' + h')} + \frac{m' \beta f (G + F)}{h'^2 (m' + h')} \right]$$

Da $\vartheta = I + w''$, so muss in dem aus 14) gefundenen Ausdrücke für ϑ ein von der Zeit unabhängiges Glied, nämlich die mittlere Neigung auftreten. In der Tat erhält man ein konstantes Glied für das Argument $h = m - n$. Daher folgt

$$I = \frac{M + N}{2n'} \cdot \cos 0^\circ \quad \text{also nach 15), wenn man die Glieder nach } \beta \text{ ordnet}$$

$$I = \frac{M' m' f (G - F)}{2n' h'^2} \beta^2 + \frac{M' (fF - G)}{2m' h'} \beta \quad \text{wobei } h' = m' - n' \text{ zu setzen ist.}$$

Wenn I aus Beobachtungen bekannt ist, so kann man hieraus β bestimmen, f hat auf diese Bestimmung so gut wie gar keinen Einfluss; nimmt man nach Prof. Franz $I = 5482''.1$ $f = 0.5$, nach Hansen $m' = 47434''.9$ $n' = -190''.6$, ferner nach Hayn die zu dem Argumente $h = m - n = g + \omega$ gehörigen Werte $F = -0.00054$ $G = 0.11541$ im absoluten Bogenmass, so erhält man $\beta = 0.0006257$. Hayn, der bei der Integration im wesentlichen der von Laplace gegebenen Methode gefolgt ist, erhält $\beta = 0.0006256$.

Wir können nun, nachdem β gefunden ist, die auf der rechten Seite von 14) auftretenden Koeffizienten numerisch berechnen. Es sei g die mittlere Anomalie des Mondes, ω der Abstand seines Perigäums vom aufsteigenden Knoten der Mondbahn, g' und ω' die entsprechenden Grössen für die Sonne, so kommen nur folgende Glieder in Betracht, wobei F und G wieder nach Hayn genommen sind.

Argument h	h'	F	G
ω	+ 591".7	— 0.00653	+ 0.00322
$g + \omega$	+ 47625 .7	— 0.00054	+ 0.11541
$(g + \omega) - 2 (g' + \omega')$	+ 40147 .7	— 0.00074	+ 0.00172

$\frac{M + N}{2(m' - h')}$	$\frac{M - N}{2(m' + h')}$
50".00 — 93".78 f	+ 48".76 — 101".40 f
+ 5471 .00 + 22 .18 f	+ 10 .97 — 0 .04 f
— 2 .53 — 1 .09 f	+ 0 .21 — 0 .09 f

Hiermit ergibt sich

$$\begin{aligned} \vartheta.w &= (- 50''.00 - 93''.78 f) \sin g \\ &+ (- 2 .53 - 1 .09 f) \sin (2g' + 2\omega') \\ &+ (- 48 .76 + 104 .40 f) \sin (g + 2\omega) \\ &+ (- 10 .97 + 0 .04 f) \sin (2g + 2\omega) \\ &+ (- 0 .21 + 0 .09 f) \sin (2g + 2\omega - 2g' - 2\omega') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w'' &= (- 50''.00 - 93 .78 f) \cos g \\ &+ (- 2 .53 - 1 .09 f) \cos (2g' + 2\omega') \\ &+ (- 48 .76 + 104 .40 f) \cos (g + 2\omega) \\ &+ (- 10 .97 + 0 .04 f) \cos (2g + 2\omega) \\ &+ (- 0 .21 + 0 .09 f) \cos (2g + 2\omega - 2g' + 2\omega') \end{aligned}$$

Setzen wir $f = f_0 + df$, wo f_0 nach Prof. Franz 0.48777 und beschränken wir uns auf die Hauptglieder, so folgt

$$\begin{aligned} 16) \quad w \cdot \sin I &= (- 95''.7 - 93''.8 df) \sin g \\ &+ (+ 2 .2 + 104 .4 df) \sin (g + 2\omega) \\ &+ (- 11 .0 + 0 .0 df) \sin (2g + 2\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 17) \quad w'' &= (- 95''.7 - 93''.8 df) \cos g \\ &+ (+ 2 .2 + 104 .4 df) \cos (g + 2\omega) \\ &+ (- 11 .0 + 0 .0 df) \cos (2g + 2\omega) \end{aligned}$$

Damit ist das System der beiden ersten Gleichungen integriert. Um noch die Libration in Länge zu ermitteln, haben wir nach 5), da man $\cos \vartheta = 1$ und $\frac{d^2m}{dt^2} = 0$ setzen kann;

$$18) \quad \frac{dr}{dt} = \frac{d^2}{dt^2} (\varphi + \psi) = \frac{d^2}{dt^2} (m + u) = \frac{d^2 u}{dt^2}$$

Vernachlässigt man nun in 6) das kleine Produkt $\gamma p q$ und entwickelt wieder nach Hayn R als Funktion der Zeit, so hat man zur Bestimmung von u

$$19) \quad \frac{d^2 u}{dt^2} + 0.988 M' \gamma \cdot u = M' \gamma \Sigma H \sin h$$

Die Integration liefert

$$u = - M' \gamma \Sigma \frac{H \sin h}{h'^2 - 0.988 M' \gamma}$$

Hierzu tritt noch das Glied

$$C \cdot \sin (c + \sqrt{0.988 M' \gamma} t)$$

der willkürlichen Libration, welches wieder zu vernachlässigen ist. Die in Betracht kommenden Werte von H und h' sind folgende

Argument h	h'	H
	g + 47034''.0 + 0.10831	
	g' + 3548 .2 - 0.00317	
- g' + ω - ω' -	3147 .3 - 0.00009	
2 (- g' + ω - ω') -	6294 .6 + 0.00120	
2 ω +	1183 .4 - 0.00003	

Nach Definition der Grössen α , β , γ ist, wenn man das kleine Produkt $\alpha\beta\gamma$ nicht berücksichtigt $\gamma = \beta (1 - f)$. Setzt man $f = f_0 + df$, nimmt für f_0 den von Prof. Franz gegebenen Wert 0.48777, für β den oben gefundenen Betrag 0.0006257, so erhält man für u

$$20) \quad \begin{aligned} u = & (- 21''.6 + 66''.9 df) \sin g \\ & + (+ 133 .3 - 314 .2 df) \sin g' \\ & + (+ 5 .1 - 12 .6 df) \sin (- g' + \omega - \omega') \\ & + (- 14 .1 + 36 .6 df) \sin (- 2g' + 2\omega - 2\omega') \\ & + (- 19 .2 - 73 .9 df) \sin 2\omega \end{aligned}$$

Es bleibt nun noch übrig, den Einfluss der so gefundenen Librationsglieder u, w und w'' auf den Ort eines

Mondkraters zu suchen. Bezeichnet man mit λ und β die selenographische Länge und Breite des Kraters, also bezogen auf den ersten, der Erde zugewandten Mondmeridian und auf den Aequator des Mondes, mit l und b seine selenozentrische, also auf die Ekliptik bezogene Länge und Breite, so hat man

$$\begin{aligned} \cos b \cos (1-n) &= -\cos \beta \cos (\lambda + m - n) \\ 21) \quad \cos b \sin (1-n) &= \sin \beta \sin I - \cos \beta \cos I \sin (\lambda + m - n) \\ \sin b &= \sin \beta \cos I + \cos \beta \sin I \sin (\lambda + m - n) \end{aligned}$$

Diese Beziehungen ergeben sich für den Fall, dass die Cassinischen Gesetze streng gelten, aus dem spärischen Dreieck zwischen dem Orte des Kraters, dem Nordpol der Ekliptik und dem Nordpol des Mondäquators, alles vom Mondzentrum aus betrachtet. Setzt man nach Prof. Franz

$$\begin{aligned} (\alpha) &= \cos I \cos b - \sin I \sin b \sin (1-n) \\ (\beta) &= \sin I \cos (1-n) \\ (\gamma) &= \sin (1-n) \\ (\delta) &= \sin b \cos (1-n), \end{aligned}$$

so folgt durch Differenziation der Gleichungen 21), wenn man noch die Differentiale von l , b , λ , β , I , m , n der Reihe nach mit Δl , Δb , $d\lambda$, $d\beta$, $dI + w''$, u , w bezeichnet,

$$\begin{aligned} 22) \quad \cos b \cdot (\Delta l - w) &= (\alpha)(d\lambda + u - w) + (\beta) \sec \beta d\beta + (\delta)(dI + w'') \\ \Delta b &= -(\beta)(d\lambda + u - w) + (\alpha) \sec \beta d\beta - (\gamma)(dI + w'') \end{aligned}$$

Hierbei sind offenbar Δl und Δb numerisch zu finden, wenn man den selenozentrischen Ort des Kraters einerseits mit Hilfe von Näherungswerten für λ und β aus den Gleichungen 21), andererseits aus den Messungen nach den im letzten Abschnitt gegebenen Formeln berechnet, und die so gefundenen Werte im Sinne Beobachtung minus Rechnung von einander abzieht. Setzt man noch zur Abkürzung

$$\begin{aligned} (\alpha) u + [\cos b - (\alpha)] w + (\delta) w'' - \cos b \Delta l &= \varepsilon df + \mu \\ - (\beta) u + (\beta) w - (\gamma) w'' - \Delta b &= \xi df + \nu, \end{aligned}$$

so kann man mittelst der aus 16) 17) und 20) gefundenen Werte für u , w und w'' , sowie den auf obige Weise be-

rechneten Differenzen Δl und Δb die numerische Grösse von ϵ , μ , ξ und ν bestimmen und erhält alsdann zur Bestimmung der Werte $d\lambda$, $d\beta$, dI und df die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} 23) \quad & (\alpha) d\lambda + (\beta) \sec \beta d\beta + (\delta) dI + \epsilon df + \mu = 0 \\ & - (\beta) d\lambda + (\alpha) \sec \beta d\beta - (\gamma) dI + \xi df + \nu = 0 \end{aligned}$$

II. Teil.

Das zu den Messungen benutzte Instrument ist ein Heliumeter von etwa 1325 mm von Fokallänge. Der weitaus grösste Teil der Beobachtungen ist von Herrn Assistenten Michailowski ausgeführt worden, nur am Anfang der Beobachtungsreihe finden sich einige, weiter unten genauer bezeichnete Messungen von Herrn Observator Gratschew. Ueber das Instrument sind aus Kasan folgende Angaben gemacht. Jede Distanzmessung besteht aus zwei Einstellungen bei verschiedener Drehung des Distanzschlüssels vor und zwei ebensolchen nach dem Durchschrauben. Jede Einstellung geschieht wie folgt. Das Heliumeter besitzt ein neues Repsold'sches Mikrometer mit 2 Paaren von Fäden. Beide Paare sind zunächst gemeinsam an einem Schlitten befestigt, der durch eine rohe Schraube bewegt werden kann. Durch diese Schraube wird das eine Fadenpaar, welches mit dem Schlitten fest verbunden ist, auf den Strich der Skale I eingestellt; sodann wird das zweite Fadenpaar, welches auf dem Schlitten verschiebbar ist, durch die Mikrometerschraube auf den nächsten Strich der Skale II eingestellt, gezählt in der Richtung der niedersteigenden Nummern der Scale I, und die Trommelablesung notiert. Die Trommel ist in 100 Teile geteilt und 2 Umdrehungen der Trommel entsprechen genähert dem Intervall zweier Skalenstriche. Die Skale selbst in $\frac{1}{3}$ mm geteilt; der Positionskreis ist auf 0'.5 ablesbar. Ausser diesen Angaben sind noch die nötigen Daten über die bei den Beobachtungen benutzten Uhren, und die Thermometer-, sowie Barometer-

korrekturen mitgeteilt. Angaben über periodische Schraubenfehler sind nicht gemacht worden. Es ist allerdings anzunehmen, dass dieselben bei der neuen Mikrometerschraube nicht sehr merklich sein werden, weshalb sie vernachlässigt werden konnten.

Die Teilungsfehler der Objektivskalen sind in Kasan selbst berechnet und in eine Tabelle gebracht worden. Die Korrekturen wurden offenbar für beide Skalen auf dieselbe Einheit bezogen, wie man aus einer Bemerkung von Prof. Dubiago schliessen kann, dass nämlich auch der Run für beide Skalen einheitlich genommen werden soll. Der Run wurde bestimmt, indem auf jeder der beiden Skalen ein Intervall von 2 Strichen gemessen wurde, und zwar auf Skale I das Intervall 75—74, auf Scale II das Intervall 76—75. Die Entfernung zweier Skalenstriche ergibt sich kleiner als 2 Schraubenumdrehungen; die dazu fehlende Grösse erhält man wie folgt in Schraubenteilen

Skale	I	II	Skale	I	II
1901 Okt. 14	— 0.0311	— 0.0297	1902 Feb. 25	— 0.0315	— 0.0269
Okt. 17	331	255	Feb. 28	316	423
Okt. 21	313	311	Mai 12	340	345
Nov. 2	375	362	1903 Mai 26	390	439
Nov. 4	343	366	Dez. 3	365	318

Skale	I	II
1904 März 28	— 0.0277	— 0.0277
Apr. 2	261	300
Apr. 20	174	330
Apr. 26	364	310
Mai 2	206	245

Im Mittel ist für I — 0.0312, für II — 0.0323. Nach Anbringung der Teilungsfehler beträgt das gemessene Intervall der ersten Skale 1.0006 Teile und das der zweiten Skale 0.9980 Teile. Dem entsprechen also 1.9688 bez. 1.9677 Schraubenumdrehungen. Da nun für die Rechnung die Schraubenablesungen halbiert werden, um sie in Skalenteile zu verwandeln, so folgt

Skale I $0.9844^{2r} = 1.0006$ also die Korrektion $+ 0^{2r}.0162$
 Skale II $0.9838^{2r} = 0.9980$ „ „ „ $+ 0 .0142$

Im Mittel ergibt sich also für 0.9841 Doppeldrehungen der Schraube die Korrektion $+ 0.0152$ und für eine solche Drehung die Korrektion $+ 154.2$ Einheiten der 4 Dezimale. Mit diesem Werte wurde eine Tabelle für die Runkorrektion gerechnet.

Zur Bestimmung des Temperatureinflusses auf die Okularstellung sind an 30 Abenden Fokussierungen auf Doppelsterne angestellt worden. Zwei davon sind ausgeschlossen, weil sie offenbar durch grobe Fehler entstellt sind, zwei andere rühren von einem anderen Beobachter her und müssen besonders berücksichtigt werden. Die übrigbleibenden sind im folgenden mitgeteilt, wobei die Temperatur des Objectives in Celsiusgraden, die Ablesung der Okularskale in mm gegeben ist

	mm		mm
1899 Okt. 2	$+14^{\circ}.8$ 12.905	1901 Okt. 7	$+ 8^{\circ}.3$ 12.839
1900 März 21	$- 5.3$ 12.806	Okt. 17	$- 2.7$ 12.897
März 29	$- 0.5$ 12.780	Okt. 18	$- 4.2$ 12.874
Mai 18	$+19.5$ 12.945	1902 Apr. 10	$- 1.8$ 12.810
Mai 20	$+21.7$ 12.781	Mai 8	$+13.6$ 12.841
1901 Jan. 15	-17.5 12.794	Nov. 29	-22.1 13.022
Apr. 20	$+ 4.4$ 13.081	1903 März 16	$- 8.5$ 13.085
Mai 13	$+12.2$ 13.075	März 20	-11.6 12.952
Juni 8	$+13.6$ 13.016	März 31	$+ 1.6$ 12.950
Juni 21	$+24.8$ 13.012	Mai 24	$+13.5$ 13.075
Aug. 9	$+26.9$ 13.050	Aug. 27	$+19.9$ 13.022
Sept. 15	$+ 2.2$ 13.059	1904 März 15	$- 5.0$ 13.054
Okt. 2	$+ 1.9$ 13.004	Mai 2	$+ 6.6$ 12.911

Bezeichnet man die Normalokularstellung bei 0° C mit N_0 , die bei t° gemessene mit N_t , den Temperaturfaktor mit x , so ist $N_t = N_0 + xt$. Nimmt man als Ausgangswert $N_0 = 12.940$ und bezeichnet die Korrektion von N_0 mit y , so erhält man 26 Gleichungen von der Form

$0 = (12.940 - N_t) + tx + y$. Man erhält die folgenden Normalgleichungen (in Logarithmen geschrieben)

$$[3.67501] x + [2.10140] y + [0.77605_n] = 0$$

$$[2.10140] x + [1.41497] y + [9.30103_n] = 0$$

Hieraus ergibt sich

$$y = + 0.001795 \pm 0.001130 \text{ w. F.}$$

$$x = + 0.001214 \pm 0.015239 \text{ w. F.}$$

Man erhält also als Normalokularstellung bei $t^0 \text{ C}$

$$N_t = 12.9418 + 0.001214 t$$

Mit diesen Werten wurde die Normalokularstellung als Funktion der Temperatur in eine Tabelle gebracht.

Es sind nun noch die von Herrn Gratschew herrührenden Fokussierungen zu berücksichtigen. Wir haben:

		mm
1898 Dez. 23	— $21^0.45$	12.936
1899 Febr. 18	— 20.50	13.046
1899 Febr. 18	— 21.75	13.346

Im Mittel ergibt sich hieraus bei $- 21^0.2 \text{ C}$ die Okularstellung 13.109. Da die wenigen, überdies bei fast derselben Temperatur angestellten Messungen zur Herleitung eines Wärmefaktors gänzlich ungeeignet sind, so ist derselbe wie oben angenommen worden; die Berechtigung dazu liegt in der Natur der Sache, wenn auch manche Beobachter, wie Schur und Ambronn, für sich bei demselben Instrument einen verschiedenen Wärmefaktor gefunden haben, was vielleicht von einer geringen Akkomodationsfähigkeit des Auges herrühren mag. Für den Beobachter Gratschew ist demnach als Normalokularstellung bei 0^0 C anzunehmen 13.083 mm mit dem Temperaturfaktor $+ 0.001214$. Es gilt dies für die Beobachtungen des Kraters Mösting A

1898 Mai 31, Juni 1, 1899 Febr. 22, März 23, März 27.

Um nun den Einfluss einer Okularverschiebung auf die gemessene Distanz zu finden, hat man diese Distanz mit einem Bruche zu multiplizieren, der entsteht, wenn man die

Okularverschiebung durch die Brennweite des Objektivs dividiert, und die so gefundene Grösse als Korrektion der Distanz beizufügen. Unter Annahme einer Brennweite von 1325 mm erhält man im vorliegenden Falle als Korrektion einer Distanz von 100 Skalenteilen $+ 0.0755 (N - 0)$ Skalenteile, wo N die Normal-, 0 die angewandte Okularstellung bedeutet. Es hat sich aber gezeigt, dass der aus Messungen hergeleitete Reduktionsfaktor etwas kleiner ist als der theoretische. Zur Herleitung des ersteren sind folgende Distanzmessungen bei den Okularstellungen 13.50 mm und 12.50 mm, also bei einer Verschiebung um 1 mm gemacht worden.

	mm	mm
	13.50	12.50
	s	s
47 — 48 H Cephei	126.3619	126.2602
ι — δ Cygni	128.2602	128.0869
ι — δ Cygni	128.1160	128.0295
63 — 64 Aurigae	137.6196	137.5392
τ — γ Persei	121.1782	121.0919
λ — μ Urs. maj.	119.0294	118.9524

Es mag bemerkt werden, dass diese Distanzen zwar wegen Run und Teilungsfehlern, nicht aber wegen Refraktion korrigiert sind, da die zusammengehörigen Messungen so angeordnet sind, dass man beide als gleichzeitig betrachten kann; es ergibt sich hieraus als Korrektion einer Distanz von 100 Skalenteilen bei 1 mm Okularverschiebung in Einheiten der 4. Dezimale der Reihe nach $+ 805, 724, 675, 584, 712, 647$; also im Mittel 691, und damit als Korrektion einer Distanz von 100 Skalenteilen bei beliebiger Okularstellung $+ 0.0691 (N - 0)$, ein Wert, der für alle Beobachtungen angenommen wurde; er beträgt 92 $\%$ des theoretisch gefundenen. Auch die Korrektion wegen Okularstellung wurde tabelliert.

Um den Skalenwert und seinen Temperaturkoeffizienten abzuleiten, sind Distanzmessungen des Cygnus- und Perseus-

kreises, sowie der Plejaden benutzt worden. Die hierzu nötigen Sternorte finden sich für die Plejaden im Berliner Jahrbuch, für die Sterne des Cygnus und Perseus sind sie nach den Angaben von Geheimrat Auwers (Die Venusdurchgänge, Deutsche Beobachtungen, Band V) angesetzt worden

Cygnus, Aequinoktium und Epoche 1885.0

	α jährl. E.B.				δ	jährl. E.B.			
	h	m	s	s					
a	20	46	0.204	— 0.0026	+ 49° 41' 55".67	+ 0".005			
b		45	58.756	— 7	50 21 20 .61	— 7			
c		46	4.820	+ 44	50 53 14 .98	— 2			
d		45	14.426	+ 20	51 29 2 .01	+ 3			
e		44	26.794	+ 65	51 59 15 .88	— 155			
f		43	1.162	— 95	52 34 37 .24	— 124			

Perseus, Aequinoktium und Epoche 1875.0

c	2	63	13.525	— 30	+ 39 8 5 .71	+ 9			
e		57	10.260	+ 97	38 21 14 .96	— 97			
f		53	55.662	— 29	38 22 53 .19	+ 2			
g		50	7.162	— 15	38 6 38 .49	— 11			
h		45	49.575	+ 36	37 49 35 .56	— 73			
i		42	41.848	+ 154	37 48 8 .15	— 89			

Plejaden, Aequinoktium und Epoche 1902.0

17	3	39	3.217	— 1	+ 23 48 19 .55	— 36			
η		41	39.389	— 4	23 48 8 .40	— 40			
27		43	19.961	— 3	23 45 13 .73	— 47			

Gemessen wurden folgende Distanzen

No. 1.	Cygnus	ab	8.	Cygnus	ce	15.	Perseus	hi
2.		bc	9.		df	16.		ce
3.		cd	10.		ad	17.		fh
4.		de	11.		be	18.		gi
5.		ef	12.		cf	19.	Plejaden	17— η
6.		ac	13.	Perseus	fg	20.		η —27
7.		bd	14.		gh	21.		17—27

Um alles auf ein einheitliches Aequinoctium zu beziehen, habe ich die gegebenen Sternorte mit Berücksichtigung der Eigenbewegung streng auf 1902.0 reduziert, und mit den so erhaltenen Werten nach den Gauss'schen Formeln der spärlichen Trigonometrie Distanz und Positionswinkel für die angegebenen Sternpaare berechnet. Für No. 1) — 15) finden sich jedoch schon Distanz und Positionswinkel in dem bereits genannten Werke von Auwers mit ihren jährlichen Aenderungen durch die Eigenbewegung angegeben, sodass sie leicht auf 1902.0 reduziert werden konnten. Auwers gibt bereits die Positionswinkel an der Mitte des Sternpaares, wie sie mit dem Heliometer gemessen werden. Um auch die nach den Gauss'schen Formeln berechneten Positionswinkel in dieser Form zu erhalten, habe ich an diese nach Chauvenet die Korrektion $-1/16 s^2 \cdot \sin 2p (1 + 2 \operatorname{tg}^2 \delta)$ angebracht. Ferner wurden die jährlichen Aenderungen der Distanzen, da die Beobachtungen immer weniger als 4 Jahre von 1902.0 entfernt sind, nach einer Nahrungsformel gerechnet. Die entsprechenden Aenderungen der Positionswinkel wurden aus demselben Grunde ganz vernachlässigt. Im folgenden sind die Distanzen in Bogensekunden, ihre jährlichen Aenderungen jedoch in Einheiten der 4. Dezimale eines Skalenteils gegeben, weil die letzteren als Korrekturen an die Beobachtungen angebracht worden sind. Hierbei, wie zu der weiter unten erwähnten Berechnung der Refraktion und Aberration wurde der genäherte Skalenwert $51''.89$ (Angabe aus Kasan) zugrunde gelegt. Man erhält so

Distanz	E. B.	Posit.Winkel	Distanz	E. B.	Posit.Winkel
1. 2864".768	— 2.3	— 0°26'37"	12. 6315".543	—15.8	— 15°48'36"
2. 1915 .354	+ 1.2	+ 1 38 45	13. 2862 .543	—21.3	250 13 0
3. 2198 .859	— 1.9	—12 34 22	14. 3212 .144	— 7.2	251 31 41
4. 1864 .270	—31.5	—13 49 25	15. 2222 .527	—26.7	267 51 32
5. 2262 .778	+15.5	—20 29 45	16. 5093 .414	—12.6	56 36 12
6. 4279 .409	— 1.2	+ 0 29 46	17. 6073 .834	— 9.2	70 54 22
7. 4083 .122	+ 1.4	— 6 0 0	18. 5377 .654	—34.6	78 11 16
8. 4062 .937	—29.5	—13 8 50	19. 2143 .330	+ 0.8	90 17 53
9. 4121 .359	—17.2	—17 30 17	20. 1391 .528	— 0.4	97 12 40
10. 6441 .012	— 1.0	— 3 59 11	21. 3529 .044	— 0.4	93 1 6
11. 5935 .919	—30.1	— 8 28 51			

Um nun die gemessenen Distanzen mit den hier gegebenen vergleichen zu können, mussten die ersteren noch wegen Refraktion und Aberration korrigiert werden. Die Refraktion wurde nach folgenden Formeln gerechnet, wobei die Distanz mit s , der Positionswinkel mit p , der Stundenwinkel mit τ , die Polhöhe mit φ , der parallaktische Winkel mit q und die Zenithdistanz mit ξ bezeichnet ist

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} q &= \operatorname{ctg} n \sec (N + \delta) & \operatorname{tg} \xi &= \operatorname{ctg} (N + \delta) \sec q \\ \sigma &= s + s \kappa [\operatorname{tg}^2 \xi \cos^2 (p - q) + 1] \\ \pi &= p - \kappa [\operatorname{tg}^2 \xi \cos (p - q) \sin (p - q) + \operatorname{tg} \xi \sin q \operatorname{tg} \delta] \\ \cos n &= \cos \varphi \sin \tau \\ \sin n \sin N &= \cos \varphi \cos \tau \\ \sin n \cos N &= \sin \varphi \end{aligned}$$

Die geographische Breite von Kasan ist dem Nautical Almanac entnommen; N und $\log \operatorname{ctg} n$ sind als Funktion des Stundenwinkels in eine Tafel gebracht worden, die im Anhang als Tafel I gegeben ist.

Um die Distanz vom Einfluss der Aberration zu befreien, hat man ihr die Korrektion $-(cC + dD)$ beizufügen, wobei $c = -s \cos \delta (\operatorname{tg} \varepsilon \operatorname{tg} \delta + \sin \alpha)$ und $d = +s \cos \delta \cos \alpha$ ist; C und D sind die bekannten Besselschen Zahlen, die dem Nautical Almanac entnommen sind. (Dasselbst sind die genannten Besselschen Zahlen unter der Bezeichnung A und B angeführt).

Der Einfluss der Temperatur auf die Distanzmessung kann jetzt bestimmt werden. Die Temperatur des Instrumentes wurde durch ein Celsiusthermometer am Objektiv und ein Reaumurthermometer am Okular gemessen. Da aber das Okularthermometer wegen der Nähe des Beobachters mehr störenden Einflüssen unterworfen ist, so habe ich nicht beide Ablesungen zum Mittel vereinigt, sondern dem Okularthermometer geringeres Gewicht beigelegt. Bezeichnet T die Temperatur des Objektivs in Celsiusgraden, t die des Okulars auch in Celsiusgraden, so ist als Temperatur des Heliometers gesetzt worden $T + \frac{1}{4}(t' - T)$. Da nun die

Ablesung des Okularthermometers t in Reaumurgraden gegeben ist, so wird obiger Ausdruck $T + 1/4 (\frac{5}{4} t - T)$, der zur Bestimmung der Instrumentaltemperatur benutzt wurde.

Die gemessenen, sowie die mit allen bisher genannten Korrekturen versehenen Distanzen sind in Tafel II gegeben.

Der Temperaturkoeffizient wurde aus allen oben angeführten Distanzen abgeleitet, mit Ausnahme von 17) und 18), da diese nur zwei-, bez. einmal gemessen und daher für die Behandlung nach der Methode der kleinsten Quadrate nicht brauchbar sind. Zunächst wurde durch einfache Mittelbildung als genäherter Skalenwert $p = 51''.88256$ gefunden und damit die berechneten Distanzen in Skalenteile verwandelt. Nennt man den so gefundenen Wert X , die Korrektur desselben x , die Ausdehnung der Distanz bei 1°C y , die Temperatur t , die gemessene Distanz s , so erhält man Gleichungen von der Form $x + ty = (s - X)$. Der aus diesen Gleichungen folgende Wert von x , die Korrektur der Distanz bei 0° , könnte zur Ableitung des Skalenwertes benutzt werden. Es ist dies aber nicht geschehen, da die Anzahl der Messungen einer einzelnen Distanz zu gering ist, um x auch nur mit einigermaßen genügender Sicherheit daraus ableiten zu können. Die zur Berechnung des Skalenwertes erforderlichen Distanzen sind vielmehr mit dem endgiltig sich ergebenden Temperaturkoeffizienten einheitlich auf 0° reduziert worden. Die aus den einzelnen Distanzen folgenden Werte von y und ihre wahrscheinlichen Fehler sind in Einheiten der 4. Dezimale

1. — 12.54 $\pm$ 5.73	8. — 18.96 $\pm$ 0.66	15. + 6.80 $\pm$ 2.05
2. + 2.50 $\pm$ 2.44	9. + 0.33 $\pm$ 7.49	16. — 2.88 $\pm$ 2.85
3. — 3.38 $\pm$ 7.70	10. — 13.99 $\pm$ 7.22	17. — —
4. — 5.98 $\pm$ 6.42	11. — 17.99 $\pm$ 3.67	18. — —
5. — 14.13 $\pm$ 9.08	12. + 17.91 $\pm$ 5.10	19. + 23.11 $\pm$ 12.04
6. — 4.84 $\pm$ 5.88	13. — 0.36 $\pm$ 2.13	20. — 7.34 $\pm$ 1.92
7. + 3.98 $\pm$ 0.46	14. + 1.55 $\pm$ 3.69	21. — 13.27 $\pm$ 7.48

Ist α der Temperaturkoeffizient, d. h. die Ausdehnung einer Distanz von 100 Skalenteilen bei 1°C , s die Distanz

in Skalenteilen, so erhalten wir Gleichungen von der Form
 $100^s x - y = 0$. Vereinigt man diese Gleichungen aufgrund
 der wahrscheinlichen Fehler von y , so folgt als Temperatur-
 faktor -0.44 ± 2.59 w. F. in Einheiten der 4. Dezimale.
 Die Kleinheit des gefundenen Wertes war zu erwarten, da
 bei den neueren aus Metall gefertigten Instrumenten die
 durch die Ausdehnung des Objektivs hervorgerufene Änderung
 der Focallänge durch die Ausdehnung des Rohres kompen-
 siert wird.

Zur Ermittlung des Skalenwertes wurden sämtliche
 Messungen einer Distanz zum Mittel vereinigt, dieses wegen
 Temperatur korrigiert und durch Hinzufügung der Eigen-
 bewegung auf die Epoche 1902.0 bezogen; in folgender
 Tabelle bedeutet n die Anzahl der zum Mittel vereinigten
 Messungen

Epoche	Temp.	Distanz	Temp. Corr.	E. B.	Distanz 1902.0	n
	⁰	^s	^s	^s		
1. 1902.4	+ 11.4	45.5746	— 0.0002	+ 0.0001	45.5745	8
2. 1902.4	+ 11.3	36.9136	— 2	— 0	36.9134	8
3. 1902.5	+ 10.2	42.3930	— 2	+ 1	42.3929	7
4. 1902.5	+ 9.2	35.9223	— 1	+ 16	35.9238	7
5. 1903.0	+ 8.0	43.6436	— 2	— 16	43.6418	5
6. 1902.5	+ 9.9	82.4866	— 4	+ 1	82.4863	4
7. 1903.0	+ 10.7	78.7133	— 4	— 1	78.7128	3
8. 1903.0	+ 10.6	78.3240	— 4	+ 30	78.3266	3
9. 1903.0	+ 10.6	79.4463	— 4	+ 17	79.4476	3
10. 1903.0	+ 10.4	124.1462	— 6	+ 1	124.1457	3
11. 1903.0	+ 10.3	114.4056	— 5	+ 30	114.4081	3
12. 1903.0	+ 10.1	121.7478	— 5	+ 16	121.7489	3
13. 1902.7	+ 9.7	55.1713	— 2	+ 15	55.1726	7
14. 1902.5	+ 9.8	61.9201	— 3	+ 4	61.9202	6
15. 1902.4	+ 11.7	42.8303	— 2	+ 11	42.8312	7
16. 1902.7	+ 8.2	98.1831	— 4	+ 9	98.1836	5
17. 1903.0	+ 1.4	117.0986	— 1	+ 9	117.0994	2
18. 1901.8	+ 5.6	103.6534	— 3	— 7	103.6524	1
19. 1902.9	— 5.9	41.3125	+ 1	— 1	41.3125	7
20. 1902.9	— 6.1	26.8128	+ 1	+ 0	26.8129	7
21. 1902.7	— 6.4	68.0236	+ 2	+ 0	68.0238	6

Nimmt man wieder als den genäherten Skalenwert $p = 51''.88256$ und verwandelt damit die in der vorletzten Kolonne der obigen Tabelle stehenden Distanzen in Bogensekunden, so folgt, wenn man mit dp die 100fache Korrektion des angenommenen Skalenwertes bezeichnet, durch Vergleichung dieser aus den Messungen erhaltenen Distanzen mit den früher berechneten

1. 0.46 $dp = +0''.246$	8. 0.78 $dp = -0''.848$	15. 0.43 $dp = -0''.335$
2. 0.37 $+0''.192$	9. 0.79 $-0''.586$	16. 0.98 $-0''.602$
3. 0.42 $-0''.594$	10. 1.24 $-0''.015$	17. 1.17 $-1''.583$
4. 0.36 $+0''.451$	11. 1.14 $-0''.134$	18. 1.04 $-0''.098$
5. 0.44 $-1''.470$	12. 1.22 $-1''.102$	19. 0.41 $-0''.068$
6. 0.82 $-0''.191$	13. 0.55 $-0''.048$	20. 0.27 $-0''.404$
7. 0.79 $-0''.700$	14. 0.62 $-0''.434$	21. 0.68 $-0''.205$

Benutzt man als Gewichte die Anzahl der Beobachtungen, aus denen jede Gleichung hergeleitet ist, so folgt daraus $dp = -0''.413 \pm 0''.113$ w. F. Also ist die Korrektion des Skalenwertes $-0''.00413 \pm 0''.00113$ w. F. Damit ergibt sich als definitiver Wert eines Skalenteils

$$p = 51''.87843 \pm 0''.00113 \text{ w. F. } \log p \ 1.7149868$$

Es bleibt noch übrig, den Nullpunkt des Positionskreises und seinen Temperaturfaktor zu ermitteln. Benutzt wurden die Positionswinkel der oben genannten 21 Sternpaare. Um wieder die gemessenen mit den berechneten Positionswinkeln vergleichen zu können, mussten erstere wegen Refraktion, Präzession, Aberration und wegen der Aufstellungsfehler des Instruments korrigiert werden.

Die Formel für Refraktion ist bereits bei der entsprechenden Formel für die Distanzen mitgegeben.

Die Reduktion wegen Aberration, Nutation und Präzession auf den Anfang des Jahres ergibt sich als $-(a'A + b'B + c'C + d'D)$, wobei

$$\begin{aligned} a' &= \frac{n}{60} \cdot \sec \delta \sin \alpha & c' &= \frac{1}{60} \cdot \text{tg } \delta \cos \alpha \\ b' &= \frac{1}{60} \cdot \sec \delta \cos \alpha & d' &= \frac{1}{60} \cdot \text{tg } \delta \sin \alpha \end{aligned}$$

Hierbei ist nach dem Nautical Almanac $n = 20''.047$ angenommen und der Faktor $\frac{1}{60}$ eingeführt, um alles in

Bogenminuten zu erhalten. A, B, C, D sind die Bessel'schen Zahlen. Die Reduktion vom Anfang des Jahres bis 1902.0 geschieht dann durch Hinzufügen von a' ($t - 1902$).

Ferner mussten die Positionswinkelmessungen wegen der Aufstellungsfehler korrigiert werden. Die hierzu nötigen Instrumentalkonstanten sind nach den von Chauvenet, Spherical and practical Astronomie, Vol. II. gegebenen Formeln in Kasan selbst berechnet worden. Nach der in dem genannten Werke gebrauchten Bezeichnungsweise ist

	ξ	η	e	c	i_1
1900 Okt. 24	+ 0'.7	— 0'.4	+ 0'.3	+ 0'.3	— 1'.5
1901 Juni 7	+ 1.0	— 0.4	+ 0.6	— 1.9	— 3.8
1902 Febr. 27	+ 1.6	— 1.0	+ 0.3	— 1.8	— 3.8
1903 Mai 25	+ 0.8	— 1.4	+ 0.3	— 0.5	— 2.4
1904 Juli 11	+ 1.6	— 1.3	+ 0.3	— 0.7	— 2.8

Die hier gegebenen Werte zeigen in den verschiedenen Jahren eine ausserordentlich zufriedenstellende Uebereinstimmung, die auf eine sehr stabile Aufstellung des Instruments schliessen lässt. Ich habe daher für die Instrumentalkonstanten den aus obigen Zahlen folgenden Mittelwert einheitlich angenommen. Berechnet man noch daraus die Grössen γ und ϑ aus $\xi = \gamma \cos \vartheta$ und $\eta = \gamma \sin \vartheta$, sowie den Ausdruck $e \cos \varphi$, wo φ die Polhöhe von Kasan ist, so folgt

$$\begin{array}{cccccc} \gamma & \vartheta & e & c & i_1 & e \cos \varphi \\ + 1'.452 & - 38^\circ 17'.4 & + 0'.36 & - 0'.92 & - 2'.86 & + 0'.202 \end{array}$$

Dann ist nach Chauvenet die Korrektion der Messung $\lambda = \gamma \sin (\tau - \vartheta) \sec \delta \pm i_1 \sec \delta \mp c \operatorname{tg} \delta - e \cos \varphi \operatorname{tg} \delta \sin \tau$ τ ist der Stundenwinkel, die oberen Vorzeichen gelten für Kreis vor, die unteren für Kreis folgt.

Die gemessenen, sowie die korrigierten Positionswinkel finden sich ebenfalls in Tafel II.

Nennt man die bei der Temperatur t sich durch Vergleichung von Messung und Rechnung ergebende Korrektion

des Positionskreises n , die Korrektion bei $0^{\circ} y$, die einer Temperaturänderung von $+1^{\circ} C$ entsprechende Zunahme des Wertes y sei x , so erhält man Gleichungen von der Form $y + tx - n = 0$. Bezeichnet man mit s die Distanz, mit α die Anzahl der zum Mittel vereinigten Positionswinkel-messungen, so habe ich als Gewicht einer Gleichung den Wert $\frac{s \alpha}{100}$ genommen, da die Genauigkeit sowohl von der Anzahl der Messungen, als auch von der Grösse der Distanz abhängig ist.

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen Zahlen zusammengestellt, wobei von den Positionswinkeln unter Fortlassung der Grade nur die Minuten und für die Distanzen abgekürzte Werte gegeben sind

No.	s/100	α	t	Positions-Winkel		n
				Beob.	Rechn.	
1.	0.46	8	$+ 11.4^{\circ}$	38.30	33.38	— 4.92
2.	0.37	8	$+ 11.3$	41.74	38.75	— 2.99
3.	0.42	7	$+ 10.2$	32.05	25.63	— 6.42
4.	0.36	7	$+ 9.2$	14.13	10.58	— 3.55
5.	0.44	5	$+ 8.0$	35.74	30.25	— 5.49
6.	0.82	4	$+ 9.9$	34.86	29.77	— 5.09
7.	0.79	3	$+ 10.7$	62.58	60.00	— 2.58
8.	0.78	3	$+ 10.6$	57.30	51.17	— 6.13
9.	0.79	3	$+ 10.6$	33.88	29.72	— 4.16
10.	1.24	3	$+ 10.4$	66.60	60.82	— 5.78
11.	1.14	3	$+ 10.3$	36.39	31.15	— 5.24
12.	1.22	3	$+ 10.1$	17.83	11.40	— 6.43
13.	0.55	7	$+ 9.7$	11.18	13.00	$+ 1.82$
14.	0.62	6	$+ 9.8$	31.33	31.68	$+ 0.35$
15.	0.43	7	$+ 11.7$	50.16	51.63	$+ 1.47$
16.	0.98	5	$+ 8.2$	36.53	36.20	— 0.33
17.	1.17	2	$+ 1.4$	56.66	54.37	— 2.29
18.	1.04	1	$+ 5.6$	13.83	11.27	— 2.56
19.	0.41	7	$- 5.9$	14.08	17.88	$+ 3.80$
20.	0.27	7	$- 6.1$	11.72	12.67	$+ 0.95$
21.	0.68	6	$- 6.4$	57.07	61.10	$+ 4.03$

Vereinigt man die sich hieraus ergebenden Gleichungen aufgrund der oben genannten Gewichte, so erhält man die Normalgleichungen (in Logarithmen)

$$[1. 80044] y + [2. 67002] x + [2. 15999] = 0$$

$$[2. 67002] y + [3. 74827] x + [3. 27764] = 0$$

Hieraus ergibt sich $x = - 0'.386 \pm 0'.105$ m. F.

$y = + 0'.570 \pm 0'.987$ m. F.

Als definitiver Wert für die Korrektion des Positionskreises bei t^0 C ist also anzunehmen $+ 0'.57 - 0'.386$ t.

III. Teil.

Die Beobachtungen von Mösting A, die zur Herleitung der selenozentrischen Länge und Breite des Kraters dienen sollen, sind so ausgeführt, dass im allgemeinen die Distanz des Kraters von 7 Randpunkten der Mondscheibe nebst den zugehörigen Positionswinkeln gemessen ist. Ich habe jedoch zur Berechnung auch diejenigen Beobachtungen herangezogen, die mindestens 5 brauchbare Randanschlüsse lieferten. Abgesehen davon, dass an zwei Abenden, 1904 Januar 29 und März 6, nur 6 Randpunkte überhaupt gemessen waren, mussten auch von den anderen Beobachtungsabenden einige Messungen gestrichen werden, die aus folgender Zusammenstellung ersichtlich sind

1899 Febr. 22	ist von	8 Beob.	die	7.	gestrichen
1901 Mai 1	"	"	7	"	" 7.
1901 Juni 28	"	"	7	"	" 2.
1902 Nov. 9	"	"	7	"	" 1.
1903 März 7	"	"	7	"	" 1. und 7.
1903 März 7	"	"	7	"	" 5.
1903 Apr. 13	"	"	7	"	" 2.
1903 Mai 9	"	"	7	"	" 7.

In den Fällen, wo sich mit Sicherheit ein Schreibfehler nachweisen liess, wurde derselbe wie folgt verbessert

1898	Juni	1	7. Messung	Skale II	lies	84	statt	81
1899	März	23	1.	Mikrom.	"	0.803	"	1.803
"	"	"	"	"	"	0.795	"	1.795
1901	Apr.	30	4.	Skale II	"	86	"	85
"	"	"	"	Posit.-Winkel	"	295° 23'.5	"	395° 23'.5
1902	Apr.	18	4.	Skale I	"	85	"	84
1902	Nov.	9	7.	"	"	83	"	82
1904	März	6	2.	Posit.-Winkel	"	339° 30'.0	"	239° 30'.0
"	"	"	3.	"	"	310° 0'.0	"	210° 0'.0
1904	März	25	3.	"	"	124° 22'.5	"	134° 22'.5
1904	Apr.	26	6.	"	"	167° 43'.0	"	164° 43'.0
"	"	"	7.	Skale II	"	1.978	"	0.978
"	"	"	7.	"	"	1.934	"	0.934
"	"	"	1.	Posit.-Winkel	"	193° 2'.5	"	93° 2'.5
"	"	"	2.	"	"	347° 10'.0	"	347° 0'.0

Die Originalmessungen habe ich ihres bedeutenden Umfanges wegen hier nicht beigegeben. Es blieben so 45 Beobachtungsabende übrig, die in Tafel III zusammengestellt sind. In dieser Tafel ist mit ϑ die Sternzeit, mit α_0 und δ_0 die dem Nautical Almanac entnommene geozentrische Rektaszension und Deklination des Mondes, mit p_0 seine Äquatoreal-Horizontal-Parallaxe, mit m seine mittlere Länge und mit n die Länge seines aufsteigenden Knotens bezeichnet. Die letzteren Werte sind dem Berliner Jahrbuch entnommen. Tafel IV enthält die entsprechenden mit Parallaxe behafteten Werte α , δ und p für den Beobachtungsort Kasan.

Nach der von Bessel im 16. Bande der Astronomischen Nachrichten gegebenen Methode wurde aus den mit allen obigen Korrekturen verbesserten Distanzen und Positionswinkeln der für jeden Beobachtungsabend gültige Mondhalbmesser h' , sowie die rechtwinkligen Koordinaten x' und y' des Kraters gegen die Mitte der Mondscheibe ermittelt. Ferner wurden gleichzeitig die Gewichte dieser Größen, sowie die Differentialquotienten $\frac{dx}{dh}$ und $\frac{dy}{dh}$ ermittelt, weil für die weitere Berechnung nicht der hier gefundene Halbmesser h' , sondern ein einheitlicher h_0 benutzt werden

sollte. h_0 wurde unter Berücksichtigung der jedesmaligen Parallaxe für jeden Abend berechnet und in Skalenteile verwandelt; für diese Berechnung wurde nach Prof. Franz der Logarithmus des Verhältnisses von Mond- und Erdradius gleich $9.4353428 - 10$ angesetzt. Die so erhaltenen Halbmesser h_0 zeigten sich im Mittel um 0.0030 Skalenteile grösser; sie wurden daher überall um diesen Betrag verkleinert und die dem so gefundenen definitiven Halbmesser h entsprechenden Werte von x und y abgeleitet. Die genannten Grössen finden sich in Tafel V.

Setzt man $x = \sigma \cos \pi$, $y = \sigma \sin \pi$, so berechnen sich die selenozentrischen Längen und Breiten auf folgende Weise. In dem Dreieck Beobachtungsort, Krater, Mondzentrum ist der Winkel am Beobachtungsort σ , der am Krater sei $180^\circ - S$, der am Mondzentrum K , dann ist $\sin S = \frac{\sin \sigma}{\sin h}$, $K = S - \sigma$ und man hat zunächst zur Bestimmung der selenozentrischen Rektaszension a und Deklination d ,

$$\begin{aligned}\sin d &= -\sin \delta \cos K + \cos \delta \sin K \cos \pi \\ \cos d \cos (a - \alpha) &= -\cos \delta \cos K - \sin \delta \sin K \cos \pi \\ \cos d \sin (a - \alpha) &= \sin K \sin \pi\end{aligned}$$

a und d sind dann in Länge l und Breite b zu verwandeln durch die bekannten Formeln

$$\begin{aligned}\sin b &= \cos \varepsilon \sin d - \sin \varepsilon \cos d \sin a \\ \cos b \sin l &= \sin \varepsilon \sin d + \cos \varepsilon \cos d \sin a \\ \cos b \cos l &= \cos d \cos a\end{aligned}$$

Die sich so ergebenden Längen und Breiten l und b des Kraters müssen nun mit den Längen und Breiten l_1 und b_1 verglichen werden, die man aufgrund der Cassinischen Gesetze erhält; die Gleichungen zur Berechnung von l_1 und b_1 sind bereits am Ende des ersten Teiles dieser Abhandlung als Gleichungen 21) gegeben. Als Ausgangswerte für λ , β und I sind nach Prof. Franz angenommen

$$\begin{aligned}\lambda &= -5^\circ 10' 19''.0 \\ \beta &= -3^\circ 11' 24''.0 \\ I &= 1^\circ 31' 22''.1\end{aligned}$$

Es bleibt nun noch übrig, die Berechnung der Koeffizienten für die Bedingungsgleichungen auszuführen. In ihnen treten die Librationsglieder w , w'' und u auf, die ihrerseits von g , g' , ω , ω' abhängen. Um die letzteren Winkel zu berechnen, wurde nach Hansen für 1900 Januar 1.0 angenommen

$$g = 309^{\circ}.1833 + 4771^{\circ}.9884.t$$

$$g' = 359^{\circ}.4655 + 359^{\circ}.9906.t$$

$$\omega = 75^{\circ}.3111 + 60^{\circ}.0320.t$$

$$\omega' = 22^{\circ}.0894 + 19^{\circ}.3586.t$$

wobei der Faktor von t die jährliche Aenderung des Winkels bedeutet, t also in julianischen Jahren zu rechnen ist.

Bei der Bildung der Differenzen $l_1 - l$ zeigte sich deutlich ein Einfluss der Phase. Der Mond wurde nämlich mit wenigen Ausnahmen immer kurz nach dem ersten Viertel beobachtet. Da die Sonne in diesem Falle den inneren östlichen Hang des Kraters beleuchtet, so ist leicht erklärlich, dass fast alle Längengleichungen eine zu grosse negative Länge für Mösting A ergeben. Diese Erklärung bestätigt sich dadurch, dass an den wenigen Tagen, wo nach Vollmond beobachtet wurde, wo also die Sonne den westlichen Abhang des Kraters beschien, sich die Länge des Kraters zu weit westlich ergibt. Wahrscheinlich auch auf eine solche exzentrische Einstellung des Kraters ist die Unbrauchbarkeit des 20. Beobachtungsabends zu schieben; die sich ergebende Längendifferenz war so bedeutend, dass die entsprechende Längengleichung bei der Bildung der Normalgleichungen nicht berücksichtigt werden konnte, während die zugehörige Breitengleichung beibehalten wurde. Es mag hier nachgeholt werden, dass bereits früher der 22. Beobachtungsabend gänzlich gestrichen werden musste, da die einzelnen Distanzmessungen in keiner Weise in Uebereinstimmung zu bringen waren. Die Werte von l , l_1 , b und b_1 sind in Tafel VI zusammengestellt; die Koeffizienten der Bestimmungsgleichungen in Länge finden sich in Tafel VII, die für Breite in Tafel VIII, wobei als Winkeleinheit $1000''$ angesetzt sind.

Was nun die Gewichtsbestimmung der einzelnen Gleichungen angeht, so kann man infolge der Messungsmethode von vornherein annehmen, dass den Längengleichungen in ihrer Gesamtheit ein andres Gewicht zukommt als den Breitengleichungen, weshalb für beide zunächst getrennt die Normalgleichungen aufgestellt sind. Als Gewicht der einzelnen Gleichungen aber könnte man genähert das in Tafel V angegebene Gewicht der x — bez. der y -Koordinate ansetzen, vorausgesetzt, dass der mittlere Fehler einer Messung für jeden Beobachtungsabend derselbe wäre. Dies ist nun aber nicht der Fall; dieser mittlere Fehler, der ganz überwiegend von den Unebenheiten des Mondrandes abhängt, also kaum mehr zufällig werden kann, liegt innerhalb so weiter Grenzen, dass dagegen die Schwankungen der oben genannten Gewichte nicht in Betracht kommen; auf diese Weise rechtfertigt sich das auch schon von Prof. Franz angewendete Verfahren, alle Längen-, sowie alle Breitengleichungen unter sich als gleichwertig anzusetzen.

Man erhält auf diese Weise folgende Normalgleichungen in Länge

$$\begin{aligned} +42.8501 d\lambda - 0.5080 d\beta + 1.2018 dJ - 7.1935 df + 9.0381 &= 0 \\ + 0.0145 d\beta - 0.0327 dJ + 0.1121 df - 0.0914 &= 0 \\ + 0.0774 dJ - 0.2622 df + 0.2240 &= 0 \\ + 2.5349 df - 1.3845 &= 0 \end{aligned}$$

und in Breite

$$\begin{aligned} + 0.0146 d\lambda + 0.4991 d\beta - 0.1047 dJ + 0.0480 df - 0.0444 &= 0 \\ + 43.8481 d\beta - 10.2515 dJ + 3.2072 df - 4.2367 &= 0 \\ + 23.1577 dJ - 0.5556 df + 0.2783 &= 0 \\ + 0.6601 df - 0.6952 &= 0 \end{aligned}$$

Gibt man den Längengleichungen das Gewicht 1, so würde man das Gewicht der Breitengleichungen aus dem Verhältnis der Summen der übrig bleibenden Fehlerquadrate ermitteln können. Da diese aber vorläufig noch unbekannt sind, so setzen wir in erster Näherung dafür nach der

Bezeichnungsweise von Tafel VII und VIII den Wert $\frac{[n \ n]}{[n' \ n']} = \frac{3.3103}{2.5749} = 1.2856$. Multipliziert man die Breiten-
gleichungen mit dieser Zahl und addiert sie zu den
Längengleichungen, so ergeben sich die folgenden Normal-
gleichungen

$$\begin{aligned} +42.8689 d\lambda + 0.1337 d\beta + 1.0672 dJ - 7.1318 df + 8.9810 &= 0 \\ +56.3857 d\beta - 13.2118 dJ + 4.2354 df - 5.5382 &= 0 \\ +29.8495 dJ - 0.9765 df + 0.5818 &= 0 \\ +3.3835 df - 2.2783 &= 0 \end{aligned}$$

Die Auflösung dieser Gleichungen ergibt

$$\begin{aligned} d\lambda &= -179''.0 & \text{Gewicht} & 26.18 \\ d\beta &= +92''.3 & \text{„} & 43.52 \\ dJ &= +34''.0 & \text{„} & 26.70 \\ df &= +0.19045 & \text{„} & 1.87 \end{aligned}$$

und die Kontrollgrösse $[nn_4] = 4.0881$.

Die Darstellung durch diese Lösungen ist folgende

$$\begin{array}{rcl} \text{Summe der positiven } v & 2931'' & \left. \begin{array}{l} 3815'' \\ 3835 \\ 2.0090 \end{array} \right\} \text{in Breite} \\ \text{„ „ negativen } v & 2951'' & \left. \begin{array}{l} \text{in Länge} \\ 3835 \\ 2.0090 \end{array} \right\} \\ [vv] & 1.5051 & \end{array}$$

$[vv]$ ist in Millionen Sekunden gegeben. Als Gesamt-
summe der Fehlerquadrate ergibt sich

$$1.5051 + 2.0090 \times 1.2856 = 4.0881,$$

wodurch die Richtigkeit der Auflösung garantiert ist.

Das Gewicht der Breitengleichungen kann nunmehr
für eine zweite Näherung genauer bestimmt werden. Ob-
wohl es der Natur der Sache nach grösser als das der
Längengleichungen sein sollte, ergibt es sich doch nach
obigen Summen der Fehlerquadrate zu $\frac{1.5051}{2.0090} = 0.7492$.

Damit die Breitengleichungen multipliziert und zu den
Längengleichungen addiert, ergibt folgende Normalgleichungen
für die zweite Näherung

$$\begin{aligned}
 +42.8610 \, d\lambda - 9.1341 \, d\beta + 1.1234 \, dJ - 7.1575 \, df + 9.0048 &= 0 \\
 +32.8645 \, d\beta - 7.7129 \, dJ + 2.5149 \, df - 3.2655 &= 0 \\
 +17.4270 \, dJ - 0.6784 \, df + 0.4325 &= 0 \\
 +3.0294 \, df - 1.9053 &= 0
 \end{aligned}$$

Hieraus folgt

$$\begin{array}{ll}
 d\lambda = -195''.2 & \text{Gewicht } 24.80 \\
 d\beta = +99''.8 & \text{„ } 26.61 \\
 dJ = +35''.6 & \text{„ } 15.58 \\
 df = +0.09285 & \text{„ } 1.65
 \end{array}$$

und die Kontrollgrösse $[nn_4] = 2.9942$.

Die übrig bleibenden Fehler sind in Tafel VII und VIII den Bedingungsgleichungen hinzugefügt und zwar ist

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Summe der positiven } v & 2924'' & 3867'' \\
 \text{„ „ negativen } v & 2926'' & 3862'' \\
 \text{[vv]} & 1.4563 & 2.0710
 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in Länge} \\ \text{in Breite} \end{array}$$

Die Gesamtsumme der Fehlerquadrate ist $1.4563 + 2.0710 \times 0.7492 = 3.0079$, die mit $[nn_4]$ genau genug übereinstimmt.

Das Verhältnis der Gewichte der Längen- und Breiten-gleichungen ist nun $\frac{1.4563}{2.0710} = 0.7032$. Rechnet man damit eine dritte Näherung, so ergibt sich

$$\begin{array}{ll}
 d\lambda = -196''.8 & \text{Gewicht } 24.68 \\
 d\beta = +100''.5 & \text{„ } 25.10 \\
 dJ = +35''.7 & \text{„ } 14.63 \\
 df = +0.0832 & \text{„ } 1.62
 \end{array}$$

Die Darstellung der Beobachtungen wird

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Summe der positiven } v & 2938'' & 3857'' \\
 \text{„ „ negativen } v & 2917'' & 3885'' \\
 \text{[vv]} & 1.4357 & 2.0829
 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in Länge} \\ \text{in Breite} \end{array}$$

Die Gesamtsumme der Fehlerquadrate ist $1.4357 + 2.0829 \times 0.7032 = 2.9004$, während die Kontrollgrösse $[nn_4]$ 2.8987 ergab.

Die 3. Näherung hat also die Resultate nicht wesentlich geändert. Die mittleren Fehler der gefundenen Werte ergeben sich folgendermassen. Die Summe der Fehlerquadrate ist 2.9004 Millionen Sekunden. Jede Längengleichung soll das Gewicht 1 erhalten, das Gewichtsverhältnis aller Längen zu allen Breitengleichungen ist 1:0,7032. Da die Anzahl der Längengleichungen 43 ist, so repräsentieren die Breitengleichungen nur 30.24 Längengleichungen. Man hat also als Anzahl der Gleichungen vom Gewichte 1 für das letzte System der Normalgleichungen 73.24 zu setzen. Folglich ist der mittlere Fehler einer Beobachtung vom Gewichte 1

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{2.9004}{73.24-4}} = \pm 0.2047 \text{ oder } \pm 204''.7.$$

Damit erhält man also als definitive Resultate der vorliegenden Arbeit

$\lambda - 5^{\circ} 13' 35''.8$	$\pm 41''.2$	mittl. Fehler
$\beta - 3 \quad 9 \quad 43 \quad .5$	$\pm 40''.9$	"
$J \quad 1 \quad 31 \quad 57 \quad .8$	$\pm 53 \quad .5$	"
$f \quad 0.5710$	$\pm 0 \quad .1608$	"

Die Hauptglieder der physischen Libration werden damit

$$\begin{aligned} u &+ 1'.8 \sin g' - 0'.3 \sin (m - \pi) - 0'.6 \sin 2 \omega \\ w \sin J &- 1'.7 \sin (m - \pi) \\ w'' &- 1'.7 \cos (m - \pi) \end{aligned}$$

Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die im Vergleich mit anderen Messungen bedeutend zu weit östliche Lage des Kraters wahrscheinlich eine Folge davon ist, dass der Krater fast immer gleich nach dem ersten Viertel beobachtet wurde (vergl. S. 35). Ferner ergibt sich, dass der Wert von f dem von Prof. Franz gefundenen sehr nahe liegt, jedenfalls aber selbst mit Berücksichtigung der durch den mittleren Fehler bedingten möglichen Änderungen den von Hayn gefundenen Wert 0.85 nicht erreicht.

Tafel I.

m	0 ^h		1 ^h		2 ^h		3 ^h		4 ^h		5 ^h											
	N	log ctg n	N	log ctg n	N	log ctg n	N	log ctg n	N	log ctg n	N	log ctg n										
0	34	12.6	— ∞	33	17.5	9.1676	30	29.3	9.4668	25	40.5	9.6368	18	46.4	9.7462	9	58.8	9.8107	60			
1		12.6	7.3897		15.7	9.1748		25.5	4703		34.7	6390		38.5	7476		49.2	8.114	59			
2		12.5	7.6908		13.8	9.1818		21.6	4738		28.8	6412		30.5	7490		39.6	8.121	58			
3		12.4	7.8668		11.9	9.1887		17.8	4773		22.8	6434		22.5	7504		30.0	8.128	57			
4		12.3	7.9918		9.9	9.1955		13.9	4808		16.8	6456		14.5	7518		20.4	8.135	56			
5		12.2	8.0887		7.9	9.2022		10.0	4842		10.8	6478		18	6.5	7532		10.8	8.142	55		
6		12.0	8.1679		5.9	9.2088		6.0	4876		25	4.7	6500		17	58.4	7546		9	1.1	8.148	54
7		11.8	8.2348		3.8	9.2104		2.0	4910		24	58.6	6521		50.3	7559		8	51.4	8.155	53	
8		11.6	8.2928		3.8	1.8	9.2218		29	57.9	4943	52.5	6543		42.1	7573		41.7	8.161	52		
9		11.4	8.3440		32	59.7	9.2281		53.8	4976		46.4	6565		33.9	7587		32.0	8.167	51		
10	34	11.1	8.3897		32	57.6	9.2344		29	49.7	9.5009	24	40.2	9.6586	17	25.7	9.7600	8	22.2	9.8173	50	
11	34	10.8	8.4275		32	55.4	9.2405		29	45.5	9.5041	24	34.0	9.6606	17	17.4	9.7613	8	12.5	9.8179	49	
12		10.4	8.4689		53	2	2466		41.4	5074		27.7	6626		9.2	7625		8	2.7	8.185	48	
13		10.0	8.5037		51.0	2526		37.2	5106		21.4	6646		17	0.9	7637		7	52.9	8.191	47	
14		9.6	8.5359		48.7	2585		33.0	5138		15.0	6667		16	52.6	7650		43.1	8.197	46		
15		9.1	8.5659		46.4	2643		28.7	5170		8.7	6687		44.2	7663		33.3	8.202	45			
16		8.7	8.5938		44.0	2709		24.4	5201		24	2.3	6708		35.7	7676		23.5	8.208	44		
17		8.2	8.6201		41.6	2756		20.1	5232		23	55.9	6728		27.2	7689		13.7	8.214	43		
18		7.7	8.6449		39.2	2812		15.7	5263		49.4	6748		18.7	7701		7	3.8	8.219	42		
19		7.1	8.6684		36.7	2867		11.3	5293		42.9	6768		10.3	7713		6	53.9	8.224	41		
20	34	6.5	8.6907		32	34.3	9.2922		29	6.8	9.5324	23	36.3	9.6787	16	1.8	9.7725	6	44.0	9.8228	40	
21	34	5.9	8.7119		32	31.9	9.2976		29	2.8	9.5354	23	29.7	9.6806	15	53.3	9.7737	6	34.1	9.8232	39	
22		5.2	7.321		29.4	3029		28	57.8	5384		23.1	6825		44.7	7748		24.1	8.237	38		
23		4.5	7.515		26.8	3081		53.2	5413		16.4	6845		36.1	7760		14.2	8.241	37			
24		3.8	7.699		24.2	3132		48.7	5442		9.8	6864		27.4	7771		6	4.2	8.246	36		
25		3.1	7.877		21.6	3183		44.1	5471		23	3.1	6883		18.7	8782		5	54.2	8.251	35	
26		2.3	8.047		18.9	3233		39.5	5500		22	56.4	6902		10.0	7793		44.2	8.255	34		
27		1.5	8.211		16.2	3283		34.8	5529		49.6	6920		13	1.3	7805		34.3	8.259	33		
28		0.6	8.368		13.5	3333		30.0	5558		42.7	6939		14	52.6	7816		24.3	8.262	32		
29	34	59.7	8.521		10.8	3382		25.2	5587		35.8	6958		14	43.9	7827		14.3	8.265	31		
30	33	58.8	8.5668		32	8.0	9.3431		28	20.4	9.5615	22	28.9	9.6976	14	35.1	9.7838	5	4.3	9.8269	30	

Tafel II.

No.	Sternpaar	Datum	gemess. korrig. Distanz	gemess. korrig. Positionswinkel
			^s	^g ['] [']
1.	ab Cygni	1901 Mai 10	45.5471.5713	179 38.88 40.02
		11	5292 5823	40.38 41.93
		13	5401 5791	39.12 40.41
		Juni 11	5402 5474	34.00 35.51
		24	5630 5785	36.38 37.98
		1903 Mai 26	5469 5684	28.88 30.60
		1904 Mai 9	5454 5854	38.00 40.29
		10	5394 5840	37.25 39.64
2.	bc Cygni	1901 Mai 10	36 8914.9089	1 40.50 41.64
		11	8724 9099	40.75 42.22
		13	8872 9130	41.88 43.06
		Juni 11	9015 9156	40.38 42.07
		24	9067 9186	38 38 40.16
		1903 Mai 26	8909 9134	38.38 40.11
		1904 Mai 9	8859 9213	43 62 45.85
		10	8699 9078	36.62 38 79
3.	cd Cygni	1901 Mai 10	42.3806.4001	167 30.88 32.00
		11	3578 4023	30.62 31.50
		13	3646 3944	29.75 30.66
		Juni 24	3861 3969	29.00 30.96
		1903 Mai 26	3571 3724	32.88 34.61
		1904 Mai 9	3484 3791	29.88 31.82
		10	3707 4056	30.88 32 80
4.	de Cygni	1901 Mai 9	35.9005.9294	165 77.75 78.59
		10	9012 9201	72.50 73.65
		11	8975 9356	76.25 77.06
		Juni 24	9065 9184	70.25 72.41
		1903 Mai 26	8866 9090	57.88 59.77
		1904 Mai 9	8757 9103	79.12 81.03
		10	8949 9334	74.50 76.37
5.	ef Cygni	1901 Mai 10	43.6124.6354	159 33.25 34.39
		11	6019 6469	34.38 34.91
		1903 Mai 26	6147 6318	34.12 36.07
		1904 Mai 9	6281 6594	34.38 36.22
		10	6077 6443	35.38 37.09

No.	Sternpaar	Datum	gemess. korrig. Distanz	gemess. korrig. Positionswinkel
6.	ac Cygni	1901 Mai 10	^s 82.4512.4815	^o 32.38 33.67
		11	4359 4991	31.38 32.63
		1903 Mai 29	4572 4846	30.88 32.79
		1904 Mai 10	4355 4810	33.25 40.37
7.	bd Cygni	1901 Mai 11	78.6440.7076	173 63.62 64.66
		1903 Mai 29	6925 7196	57.00 59.00
		1904 Mai 10	6662 7128	62.00 64.09
8.	ce Cygni	1901 Mai 11	78.2785.3349	166 57.88 58.74
		1903 Mai 29	2919 3106	54.25 56.51
		1904 Mai 10	2881 3264	54.62 56.64
9.	df Cygni	1901 Mai 11	79.3920.4512	162 34.00 34.77
		1903 Mai 29	4287 4499	32.62 35.06
		1904 Mai 10	3965 4379	29.75 31.80
10.	ad Cygni	1901 Mai 11	124.0699.1501	176 4.88 5.98
		1903 Juni 1	0937 1335	1.25 3.02
		1904 Mai 10	1030 1549	8.62 10.81
11.	be Cygni	1901 Mai 11	114.3445.4145	171 36.62 37.62
		1903 Juni 1	3516 3923	30.00 31.82
		1904 Mai 10	3604 4101	37.50 39.72
12.	ef Cygni	1901 Mai 11	121.6576.7397	164 16.62 17.50
		1903 Juni 1	7170 7612	14.12 16.05
		1904 Mai 10	6836 7426	17.75 19.95
13.	fg Persei	1901 Aug. 3	55.1382.1640	70 12.12 13.17
		Aug. 6	1482 1663	10.12 8.62
		Aug. 21	1642 1815	10.25 9.35
		Okt. 11	1610 1809	14.12 14.96
		1903 Sept. 17	1483 1648	11.25 11.43
		1904 März 21	1237 1678	8.62 8.29
14.	gh Persei	23	1421 1739	13.12 12.46
		1901 Aug. 3	61.8709.9014	71 32.25 31.33
		6	9014 9322	32.62 31.27
		21	8932 9291	30.88 30.22
		Okt. 11	8747 9096	32.12 32.15
		1904 März 21	8521 9180	31.12 31.64
		23	8686 9301	31.25 31.39

No.	Sternpaar	Datum	gemess. korrig. Distanz	gemess. korrig. Positionswinkel
			^s	⁰ ['] ⁰⁰ [']
15.	hi Persei	1901 Aug. 3	42.8049.8378	87 52 00 50.87
		6	7899 8260	51.75 49.83
		9	8140 8523	50.75 48.63
		21	7970 8301	49.62 48.91
		Okt. 11	8002 8254	51.62 52.79
		1904 März 21	7842 8200	44.88 45.95
		23	7854 8207	53.38 54.13
16.	ce Persei	1901 Aug. 9	98.1509.1728	56 37.38 37.50
		21	1662 1929	36 12 36.45
		Okt. 11	1329 1732	37.38 38.97
		1904 März 21	0662 1921	34.75 34.72
		23	0710 1843	35.25 35.03
17.	fh Persei	1901 Okt. 11	117.0310.0773	70 54.75 56.55
		1904 März 23	116.9609 1198	55.50 56.78
18.	gi Persei	1901 Okt. 11	103.6091.6534	78 11.88 13.83
19.	17- γ Plejad.	1901 Okt. 14	41.2911.3079	90 16.75 12.02
		18	2870 3095	13.88 8.76
		1903 März 13	2805 2902	15.38 15.03
		14	2920 3058	12.12 11.99
		16	2912 3131	14.00 14.87
		18	2924 3122	18.00 18.52
		1904 März 15	3045 3491	13.88 17.39
20.	η -27 Plejad.	1901 Okt. 14	26.7870.8044	97 8.38 3.87
		18	7961 8156	13.38 8.57
		1903 März 13	8014 8144	9.38 9.13
		14	7990 8136	20.38 20.38
		16	7941 8135	9.88 10.90
		18	7966 8148	10.88 11.54
		1904 März 15	7830 8134	13.62 17.36
21.	17-27 Plejad.	1901 Okt. 14	67.9887.0198	92 60.00 55.74
		18	9793 0173	59.38 54.91
		1903 März 13	9897 0171	56.25 56.29
		14	9864 0192	55.25 55.55
		16	9639 0217	55.88 58.14
		18	9994 0463	60.50 61.79

Tafel III.

No.	Datum	ϑ		z_0		δ_0		$\log \sin p_0$	m		n	
		h	m	h	m	0	$'$		0	$'$	0	$'$
1.	1898 Mai 31	14 54	22.1	12 58	32.71	—	11 52	38.9	205	9 41.2	289	49 32.0
2.	1898 Juni 1	14 44	37.6	13 52	29.18	—	16 56	15.2	23	899	289	46 23.2
3.	1899 Febr. 22	10 11	31.4	8 23	24.61	+	16 59	53.3	194	12 46.4	275	40 58.8
4.	1899 März 23	12 55	43.9	9 43	0 54	+	9 37	19.0	146	47 0.7	274	8 43.8
5.	1900 Mai 8	12 34	2.4	10 44	29.68	+	2 20	21.0	160	26 18.7	252	23 19.7
6.	1901 Apr. 29	11 20	47.6	11 34	8.10	—	2 3	46.6	170	54 0.1	233	32 18.8
7.	1901 Apr. 30	11 25	34.6	12 18	56.18	—	6 10	35.0	184	5 2.8	233	29 8.1
8.	1901 Mai 1	13 59	42.7	13 8	57.05	—	10 24	54.4	198	37 51.7	233	25 37.6
9.	1901 Juni 28	17 8	55.9	15 53	12.46	—	19 29	9.7	242	30 7.4	230	21 25.9
10.	1901 Juli 30	18 52	25.3	19 59	57.15	—	15 47	26.6	303	56 33.5	228	39 50.2
11.	1901 Aug. 2	21 11	40.7	22 43	27.94	—	3 4	36.6	344	37 54.8	228	29 59.9
12.	1901 Okt. 21	22 51	7.0	20 41	13.02	—	12 51	8.6	316	46 22.5	224	16 17.7
13.	1902 Apr. 18	13 47	22.4	10 50	35.94	+	2 53	33.4	157	5 23.0	214	47 8.9
14.	1902 Apr. 20	12 33	55.0	12 23	38.72	—	5 10	7.8	182	41 49.9	214	40 58.4
15.	1902 Mai 16	13 46	11.4	11 24	0 30	+	0 0	2.8	165	0 27.4	213	18 25.9
16.	1902 Mai 17	13 43	51.9	12 11	14.99	—	4 6	8.2	178	7 36.6	213	15 16.1
17.	1902 Okt. 14	22 32	17.7	23 12	9.49	—	1 40	49.5	354	0 42.9	205	18 49.2
18.	1902 Nov. 9	20 34	48.1	21 55	55.37	—	7 55	9.6	334	35 26.4	203	56 51.8
19.	1903 März 7	7 37	55.9	5 52	6.79	+	18 28	45.3	91	12 41.1	197	41 20.8
20.	1903 März 7	10 52	2.0	6 0	10.17	+	18 26	26.6	92	58 57.6	197	40 45.1

No.	Datum	θ	α_0	h	m	s	z_0	$\log \sin p_0$	m	n
21.	März 11	9 54 24.3	9 52 46.42	+	8 42	8.6		8.24 043	145 0 1' 6.4"	197 28 22.3
22.	Apr. 10	11 56 38.0	12 15 43.01	—	2 49	27.4		22 754	180 20 47.2	195 53 2.8
23.	Apr. 13	13 44 53.6	14 54 31.28	—	13 57	4.0		21 375	220 45 20.2	195 43 18.2
24.	Mai 9	13 26 23.3	13 42 5.25	—	9 28	57.5		21 729	202 14 15.5	194 20 57.6
25.	Mai 10	12 36 22.3	14 31 13.34	—	12 40	21.8		21 355	214 55 18.0	194 17 54.1
26.	Jun. 3	14 38 7.9	11 48 2.30	—	0 19	46.3		22 547	171 24 10.2	193 1 35.3
27.	5	15 51 16.7	13 31 7.38	—	8 35	16.9		21 609	198 21 4.3	192 55 5.5
28.	8	15 21 10.7	16 1 22.86	—	16 50	26.2		20 495	237 29 51.8	192 45 39.1
29.	Sept 1	19 39 28.6	18 42 43.96	—	17 51	56.2		19 783	276 47 25.7	188 15 45.3
30.	1904 Jan. 29	7 33 47.0	5 52 59.07	+	18 18	53.8		24 104	94 22 18.2	180 18 53.8
31.	März 6	12 24 47.2	15 16 59.91	—	13 48	41.2		22 495	223 13 21.9	178 21 1.2
32.	25	8 1 59.7	7 1 57.85	+	17 36	1.6		23 381	110 29 33.6	177 21 23.8
33.	25	11 9 34.0	7 9 33.85	+	17 26	49.9		23 448	112 12 15.6	177 20 59.0
34.	26	7 17 4.7	7 58 40.43	—	16 1	11.7		23 858	123 13 23.6	177 18 19.6
35.	März 26	13 9 5.9	8 13 0.96	+	15 27	48.6		23 969	126 26 7.8	177 17 33.1
36.	März 27	7 31 31.1	8 57 52.17	+	13 20	13.5		24 483	136 29 43.5	177 15 7.6
37.	27	12 9 18.0	9 9 8.35	+	12 42	55.4		24 352	139 1 48.9	177 14 30.9
38.	Apr. 3	13 32 46.0	15 48 2.16	—	15 16	34.4		22 608	231 46 29.6	176 52 9.3
39.	23	11 56 48.7	8 48 9.68	+	13 56	42.9		23 634	133 41 54.5	175 48 59.6
40.	Apr. 24	10 56 40.7	9 42 21.87	+	10 47	16.1		23 875	146 17 57.6	175 45 57.3
41.	Apr. 25	9 60 36.4	10 36 3.71	+	7 0	6.6		24 042	158 55 41.0	175 42 54.5
42.	26	10 21 26.3	11 32 10.49	+	2 34	17.7		24 115	172 15 30.9	175 39 41.7
43.	26	14 35 39.0	11 41 54.09	+	1 46	31.8		24 115	174 34 41.9	175 39 8.1
44.	27	13 17 49.4	12 33 57.18	—	2 30	31.2		24 041	187 0 30.9	175 36 8.3
45.	Apr. 28	13 15 20.1	13 28 57.91	—	6 51	55.4		23 821	200 7 34.6	175 32 58.5

No.	α	δ	$\log \sin p$	No.	α	δ	$\log \sin p$
1.	$12^{\circ} 57' 26.69'' - 12^{\circ} 46' 9.7''$		8 234 550	26.	$11^{\circ} 46' 33.66'' - 1^{\circ} 7' 48.1''$		8 228 425
2.	$13^{\circ} 51' 57.18'' - 17^{\circ} 52' 59.9''$		241 085	27.	$13^{\circ} 29' 52.80'' - 9^{\circ} 25' 28.2''$		218 425
3.	$8^{\circ} 22' 26.22'' + 16^{\circ} 24' 51.5''$		201 504	28.	$16^{\circ} 1' 45.72'' - 17^{\circ} 42' 57.5''$		206 941
4.	$9^{\circ} 41' 27.18'' + 8^{\circ} 56' 11.3''$		203 319	29.	$18^{\circ} 42' 12.21'' - 18^{\circ} 43' 43.0''$		199 616
5.	$10^{\circ} 43' 33.00'' + 1^{\circ} 36' 30.9''$		201 259	30.	$5^{\circ} 51' 57.96'' + 17^{\circ} 41' 11.5''$		246 666
6.	$11^{\circ} 34' 15.29'' - 2^{\circ} 49' 57.3''$		202 321	31.	$15^{\circ} 18' 32.01'' - 14^{\circ} 40' 39.0''$		226 376
7.	$12^{\circ} 19' 24.73'' - 6^{\circ} 58' 23.5''$		199 979	32.	$7^{\circ} 1' 21.43'' + 16^{\circ} 59' 0.7''$		239 534
8.	$13^{\circ} 8' 29.63'' - 11^{\circ} 14' 16.5''$		198 574	33.	$7^{\circ} 7' 32.53'' + 16^{\circ} 45' 5.1''$		238 294
9.	$15^{\circ} 52' 29.72'' - 20^{\circ} 21' 25.4''$		202 393	34.	$7^{\circ} 59' 5.89'' + 15^{\circ} 22' 40.6''$		244 307
10.	$20^{\circ} 0' 36.37'' - 16^{\circ} 41' 19.6''$		222 547	35.	$8^{\circ} 10' 46.36'' + 14^{\circ} 42' 34.7''$		242 424
11.	$22^{\circ} 44' 20.07'' - 3^{\circ} 54' 55.0''$		235 951	36.	$8^{\circ} 58' 43.91'' + 12^{\circ} 38' 48.8''$		248 144
12.	$20^{\circ} 40' 2.92'' - 13^{\circ} 42' 59.5''$		219 979	37.	$9^{\circ} 7' 29.16'' + 11^{\circ} 59' 23.1''$		247 832
13.	$10^{\circ} 49' 6.69'' + 2^{\circ} 8' 2.3''$		217 763	38.	$15^{\circ} 49' 18.02'' - 16^{\circ} 9' 51.0''$		227 741
14.	$12^{\circ} 23' 33.05'' - 5^{\circ} 58' 45.4''$		210 747	39.	$8^{\circ} 46' 28.10'' + 13^{\circ} 14' 25.0''$		240 584
15.	$11^{\circ} 22' 46.30'' - 0^{\circ} 46' 26.3''$		215 502	40.	$9^{\circ} 41' 37.90'' + 10^{\circ} 4' 32.7''$		243 853
16.	$12^{\circ} 10' 25.28'' - 4^{\circ} 54' 5.7''$		210 976	41.	$10^{\circ} 36' 24.84'' + 6^{\circ} 14' 47.4''$		245 342
17.	$23^{\circ} 12' 32.11'' - 2^{\circ} 29' 25.8''$		226 541	42.	$11^{\circ} 32' 51.94'' + 1^{\circ} 45' 59.7''$		245 466
18.	$21^{\circ} 56' 39.70'' - 8^{\circ} 44' 58.1''$		212 489	43.	$11^{\circ} 40' 20.54'' + 0^{\circ} 57' 37.8''$		244 397
19.	$5^{\circ} 51' 3.37'' + 17^{\circ} 51' 25.0''$		242 690	44.	$12^{\circ} 33' 31.26'' + 3^{\circ} 21' 36.2''$		244 282
20.	$5^{\circ} 57' 54.81'' + 17^{\circ} 42' 47.8''$		240 598	45.	$13^{\circ} 29' 6.02'' - 7^{\circ} 44' 58.4''$		241 630
21.	$9^{\circ} 52' 45.44'' + 7^{\circ} 58' 3.4''$		245 574				
22.	$12^{\circ} 15' 54.01'' - 3^{\circ} 39' 13.8''$		231 326				
23.	$14^{\circ} 55' 10.71'' - 14^{\circ} 49' 33.5''$		216 001				
24.	$13^{\circ} 42' 11.97'' - 10^{\circ} 20' 23.1''$		220 251				
25.	$14^{\circ} 32' 16.25'' - 13^{\circ} 31' 51.1''$		215 643				

Tafel V.

	x'	dx/dh	Gew.	y'	dy/dh	Gew.	h'	Gew.	h_0	h	x	y
1.	— 3.0327	+ 0.426	2.469	— 1.8815	— 1.211	0.823	18.5762	1.583	18.5923	18.5893	— 3.0271	— 1.8974
2.	— 3.1887	+ 0.319	2.916	— 1.4532	— 1.243	0.818	18.8835	1.672	18.8742	18.8712	— 3.1926	— 1.4379
3.	— 2.2811	+ 0.169	2.503	+ 0.9432	— 1.221	0.488	17.2757	0.826	17.2301	17.2271	— 2.2893	+ 1.0025
4.	— 2.8377	+ 0.343	2.128	— 0.0318	— 1.224	0.466	17.3368	0.796	17.3022	17.2992	— 2.8506	+ 0.0142
5.	— 3.7325	+ 0.376	2.449	+ 0.5817	— 1.235	0.663	17.2239	1.240	17.2204	17.2174	— 3.7349	+ 0.5897
6.	— 3.7819	+ 0.445	2.780	+ 1.4128	— 1.194	0.983	17.2882	2.037	17.2625	17.2595	— 3.7947	+ 1.4471
7.	— 3.4175	+ 0.477	2.602	+ 1.2317	— 1.184	1.014	17.1559	2.075	17.1697	17.1667	— 3.4123	+ 1.2189
8.	— 2.9155	+ 0.495	2.053	+ 0.9218	— 1.194	0.772	17.1103	1.508	17.1142	17.1112	— 2.9151	+ 0.9207
9.	— 1.1330	+ 0.304	2.227	+ 0.6661	— 1.196	0.728	17.2616	1.347	17.2654	17.2624	— 1.1328	+ 0.6651
10.	+ 0.6356	— 0.012	3.460	— 0.0948	— 1.284	0.594	18.0639	1.174	18.0855	18.0825	+ 0.6354	— 0.1187
11.	+ 0.8095	+ 0.820	1.203	+ 0.2469	+ 0.985	0.927	18.6511	1.228	18.6524	18.6494	+ 0.8081	+ 0.2452
12.	+ 0.6455	— 0.161	3.327	— 1.0304	— 1.267	0.681	17.9571	1.372	17.9788	17.9758	+ 0.6425	— 1.0541
13.	— 3.9799	+ 0.495	2.375	+ 2.0413	— 1.193	0.889	17.8875	1.727	17.8803	17.8843	— 3.9770	+ 2.0344
14.	— 3.2672	+ 0.406	2.837	+ 1.9631	— 1.220	0.940	17.6201	1.982	17.6007	27.5977	— 3.2763	+ 1.9904
15.	— 3.9010	+ 0.461	2.414	+ 2.3239	— 1.210	0.819	17.7930	1.584	17.7945	17.7915	— 3.9017	+ 2.3257
16.	— 3.5243	+ 0.517	2.217	+ 2.2529	— 1.191	0.835	17.6043	1.568	17.6100	17.6070	— 3.5229	+ 2.2497
17.	— 0.0241	— 0.275	2.977	— 0.1938	— 1.253	0.691	18.2473	1.360	18.2526	18.2496	— 0.0247	— 0.1967
18.	+ 0.3913	— 0.010	2.537	— 0.4898	— 1.256	0.317	17.6914	0.552	17.6714	17.6684	+ 0.3915	— 0.4609
19.	— 3.3243	— 0.151	2.167	+ 0.7176	— 1.279	0.317	18.9359	0.589	18.9440	18.9410	— 3.3251	+ 0.7111
20.	— 3.3617	— 0.049	2.542	+ 0.6518	— 1.372	0.599	18.8660	1.553	18.8530	18.8500	— 3.3609	+ 0.6738

21.	— 3.7137	+	0.253	3.510	+	1.4099	—	1.230	1.038	19.0556	2.393	19.0703	19.0673	— 3.7107	+	1.3955	
22.	— 1.1044	—	0.291	2.738	+	2.9230	+	1.152	0.883	17.8139	1.744	17.8149	17.8119	— 1.1038	+	2.9207	
23.	— 1.9854	+	0.327	2.002	+	2.6944	—	1.242	0.437	18.0001	0.785	17.9901	17.9871	— 1.9897	+	2.7106	
24.	— 1.4309	+	0.646	2.549	+	2.9193	—	0.940	1.716	17.7567	3.517	17.8002	17.7972	— 1.4047	+	2.8812	
25.	— 3.1816	+	0.656	1.611	+	2.4923	—	1.116	0.800	18.3367	1.292	18.3319	18.3289	— 3.1867	+	2.5010	
26.	— 2.1454	+	0.543	2.228	+	2.8476	—	1.172	0.895	17.9093	1.686	17.9146	17.9116	— 2.1444	+	2.8454	
27.	— 0.3732	+	0.605	2.187	+	2.9239	—	1.139	1.004	17.4427	1.904	17.4471	17.4441	— 0.3724	+	2.9223	
28.	— 1.0167	+	0.104	3.571	+	2.5249	—	1.290	0.674	17.1294	1.407	17.1553	17.1523	+	1.0191	+	2.4954
29.	— 3.4970	+	0.161	2.588	—	0.3197	—	1.275	0.441	19.1241	0.834	19.1183	19.1153	— 3.4984	—	0.3085	
30.	— 0.6901	—	0.329	2.092	+	4.0212	+	1.228	0.468	18.2153	0.832	18.2456	18.2426	— 0.6991	+	4.0547	
31.	— 3.3600	+	0.071	3.698	—	0.5537	—	1.279	0.803	18.8089	1.754	18.8069	18.8039	— 3.3604	—	0.5473	
32.	— 3.3428	+	0.100	3.594	—	0.6499	—	1.280	0.756	18.7593	1.647	18.7523	18.7493	— 3.3438	—	0.6378	
33.	— 3.1816	+	0.205	3.319	—	0.4476	—	1.269	0.777	19.0248	1.636	19.0147	19.0117	— 3.1843	—	0.4310	
34.	— 3.1275	+	0.237	3.269	—	0.5655	—	1.260	0.823	18.9219	1.745	18.9325	18.9295	— 3.1257	—	0.5751	
35.	— 2.9675	+	0.342	2.782	—	0.1497	—	1.243	0.762	19.1887	1.516	19.1835	19.1805	— 2.9703	—	0.1395	
36.	— 2.8912	+	0.368	2.778	—	0.2682	—	1.232	0.831	19.1771	1.666	19.1697	19.1667	— 2.8950	—	0.2554	
37.	— 0.2868	—	0.059	3.168	+	3.8618	+	1.258	0.528	18.3055	0.972	18.3031	18.3001	— 0.2865	+	3.8550	
38.	— 2.9667	+	0.415	2.450	—	0.2093	+	1.222	0.750	18.8645	1.427	18.8524	18.8494	— 2.9730	—	0.2278	
39.	— 2.7102	+	0.519	2.063	+	0.1156	—	1.176	0.781	19.0088	1.383	18.9949	18.9919	— 2.7190	+	0.1355	
40.	— 2.4423	+	0.495	2.182	+	0.6206	—	1.193	0.776	19.0679	1.422	19.0601	19.0571	— 2.4476	+	0.6335	
41.	— 2.1301	+	0.502	2.471	+	1.2000	—	1.177	0.971	19.0888	1.914	19.0655	19.0625	— 2.1433	+	1.2310	
42.	— 2.0889	—	0.525	2.271	+	1.1206	—	1.181	0.889	19.0321	1.689	19.0187	19.0157	— 2.0803	+	1.1400	
43.	— 1.7762	+	0.547	2.006	+	1.8189	—	1.445	0.912	18.9962	2.154	19.0136	19.0106	— 1.7683	+	1.8024	
44.	— 1.4138	+	0.708	2.255	+	2.4907	—	0.966	1.594	18.8588	3.037	18.8979	18.8949	— 1.3882	+	2.4558	
45.																	

Tafel VI.

	l	b	l_1	b_1	i	b	l_1	b_1
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	19 55 48.2	— 4 46 22.5	19 59 23.3	— 4 43 43.2	26.	346 11 18.1	— 3 41 13.6	— 3 52 31.9
2.	32 59 26.3	— 4 39 17.0	33 3 54.3	— 4 40 19.5	27.	13 15 1.9	— 3 0 36.2	— 3 10 55.0
3.	298 59 57.0	— 3 41 54.9	298 57 20.2	— 3 47 33.8	28.	52 16 6.6	— 2 10 28.3	— 2 13 10.0
4.	321 29 24.2	— 4 15 47.1	321 32 38.3	— 4 18 41.6	29.	91 27 10.1	— 1 31 59.9	— 1 40 38.7
5.	335 13 30.9	— 4 49 22.4	335 15 12.8	— 4 42 3.8	30.	269 8 49.4	— 4 43 48.4	— 4 42 45.2
6.	345 46 22.7	— 4 34 19.1	345 46 2.0	— 4 35 59.5	31.	38 11 14.3	— 2 14 23.0	— 2 13 0.0
7.	358 56 32.5	— 4 24 16.4	358 58 15.6	— 4 25 49.6	32.	285 18 12.1	— 4 40 46.7	— 4 38 18.4
8.	13 29 48.6	— 4 12 13.8	13 32 2.9	— 4 10 2.8	33.	286 57 51.3	— 4 37 45.0	— 4 37 25.3
9.	57 22 55.9	— 3 4 9.8	57 24 42.8	— 3 0 14.6	34.	298 6 19.4	— 4 29 44.7	— 4 29 54.3
10.	118 47 35.6	— 1 45 22.2	118 47 34.9	— 1 45 25.7	35.	301 18 1.0	— 4 23 31.6	— 4 27 9.0
11.	159 25 54.7	— 1 47 1.5	159 26 11.0	— 1 46 4.2	36.	311 21 48.8	— 4 18 14.2	— 4 17 0.5
12.	131 30 27.4	— 1 40 21.7	131 36 14.4	— 1 40 7.9	37.	313 56 2.4	— 4 9 38.1	— 4 14 7.1
13.	331 54 50.0	— 4 23 34.1	331 57 53.1	— 4 32 41.8	38.	46 40 7.0	— 2 0 21.6	— 2 1 39.4
14.	357 33 30.5	— 4 6 39.4	357 36 9.8	— 4 6 32.5	39.	308 42 21.4	— 4 19 58.7	— 4 18 30.2
15.	339 51 16.0	— 4 17 15.1	339 53 45.4	— 4 24 47.6	40.	321 13 31.4	— 4 3 11.5	— 4 3 17.0
16.	353 0 15.3	— 4 11 47.2	353 1 47.3	— 4 10 27.1	41.	333 51 18.1	— 3 44 44.0	— 3 45 30.3
17.	168 42 44.4	— 2 13 56.5	168 46 53.3	— 2 17 2.8	42.	347 8 8.2	— 3 22 20.3	— 3 24 57.4
18.	149 12 35.6	— 1 51 38.3	149 22 44.5	— 1 56 58.1	43.	349 28 40.3	— 3 18 30.3	— 3 21 16.1
19.	265 52 14.1	— 4 31 14.0	266 0 3.9	— 4 36 18.6	44.	1 56 7.5	— 2 58 59.1	— 3 1 24.7
20.	267 29 33.1	— 4 29 44.0	267 46 31.3	— 4 37 19.1	45.	15 0 4.1	— 2 37 46.1	— 2 40 59.2
21.	319 51 44.0	— 4 28 52.0	319 54 4.3	— 4 28 32.8				
22.								
23.	35 42 11.3	— 2 28 29.0	35 39 25.0	— 2 40 18.0				
24.	17 4 17.7	— 3 2 25.8	17 8 58.2	— 3 7 0.2				
25.	29 47 18.4	— 2 43 52.1	29 49 34.7	— 2 46 59.8				

	a	b	c	d	n	s'	v	vv					
1.	+ 0.998	dλ	— 0.000	dβ	+ 0.000	dJ	— 0.149	df	+ 0.298	= 0	+ 1.147	+ 0.090	0.0081
2.	+ 998	—	006	—	138	—	—	—	+ 348	—	+ 1.221	+ 142	202
3.	+ 998	—	024	—	331	—	—	—	+ 060	—	+ 0.570	— 285	812
4.	+ 999	+	018	—	420	—	—	—	+ 319	—	+ 0.865	+ 085	72
5	+ 998	+	003	—	256	—	—	—	+ 220	—	+ 0.955	+ 002	0
6.	+ 999	—	010	—	195	—	—	—	+ 110	—	+ 0.934	— 102	104
7.	+ 999	—	015	—	207	—	—	—	+ 237	—	+ 1.059	+ 024	6
8.	+ 998	—	020	—	222	—	—	—	+ 272	—	+ 1.084	+ 057	32
9.	+ 998	—	026	—	042	—	—	—	+ 150	—	+ 1.132	— 050	25
10.	+ 998	—	009	+	110	+	—	—	— 034	—	+ 1.075	— 220	484
11.	+ 998	+	010	+	139	+	—	—	— 028	—	+ 1.108	— 211	445
12.	+ 998	—	001	+	248	+	—	—	+ 233	—	+ 1.479	+ 061	37
13.	+ 998	—	012	—	276	—	—	—	+ 268	—	+ 1.014	+ 048	23
14.	+ 998	—	021	—	279	—	—	—	+ 244	—	+ 0.999	+ 023	5
15.	+ 998	—	016	—	220	—	—	—	+ 206	—	+ 1.014	+ 009	1
16.	+ 998	—	020	—	229	—	—	—	+ 152	—	+ 0.957	— 064	41
17.	+ 998	+	021	+	220	+	—	—	+ 111	—	+ 1.318	— 063	40
18.	+ 999	+	015	+	184	+	—	—	+ 491	—	+ 1.669	+ 313	980
19.	+ 999	+	010	+	345	+	—	—	+ 607	—	+ 1.241	+ 380	1444
20.													

4*

	a	b	c	d	n	s	v	vv
21.	+ 0.999 dλ	- 0.014 dβ	+ 0.042 dJ	- 0.292 df	+ 0.229 = 0	- 0.964	+ 0.007	0.0000
22.	+							
23.	998	025	044	250	050	0.717	268	718
24.	998	027	054	137	364	+ 1.252	155	240
25.	998	026	047	153	220	- 1.086	+ 010	1
26.	+							
27.	998	024	060	046	498	+ 1.486	299	894
28.	998	027	056	025	085	+ 1.087	113	128
29.	998	020	030	021	441	- 1.428	243	590
30.	998	003	003	328	524	- 1.850	359	1289
	998	000	002	094	262	+ 1.164	058	34
31.	+							
32.	998	020	030	172	170	+ 0.666	382	1459
33.	999	008	025	325	349	+ 1.040	124	154
34.	999	009	027	324	541	+ 1.234	316	999
35.	999	014	040	314	161	+ 0.872	063	40
	999	015	043	311	239	+ 0.955	+ 014	2
36.	+							
37.	998	018	052	301	268	+ 0.999	045	20
38.	998	019	054	298	149	+ 0.884	074	55
39.	998	017	023	288	088	+ 0.804	135	182
40.	999	018	051	295	246	- 0.491	468	2190
	998	022	058	279	080	+ 0.835	141	199
41.	+							
42.	998	025	061	262	098	+ 0.870	121	146
43.	998	026	059	245	276	+ 1.062	058	34
44.	998	026	058	242	203	+ 0.991	014	2
45.	998	026	052	237	074	+ 0.861	143	204
	998	025	044	214	226	+ 1.029	011	1

Tafel VIII.

— 53 —

	a'	b'	c'	d'	n'	s'	v	vv
1.	+ 0.000 dλ	+ 0.998 dβ	- 1.000 dJ	+ 0.067 df	+ 0.190 = 0	+ 0.255	+ 0.260	0.0676
2.	+ 006	+ 998	- 0.973	+ 065	- 031	+ 0.065	+ 039	15
3.	+ 024	+ 998	- 396	+ 073	- 379	+ 0.126	- 296	876
4.	- 018	+ 999	- 736	- 088	- 226	- 0.069	- 158	250
5.	- 003	+ 998	- 993	- 195	+ 330	+ 0.137	+ 377	1421
6.	+ 010	+ 999	- 926	- 085	- 158	- 0.160	- 101	102
7.	+ 015	+ 999	- 814	- 069	- 148	- 0.017	- 087	76
8.	+ 020	+ 998	- 642	- 087	- 080	+ 0.369	+ 145	210
9.	+ 026	+ 998	- 124	- 053	- 206	+ 1.301	+ 300	900
10.	+ 009	+ 998	- 940	- 033	- 018	+ 1.896	+ 111	123
11.	- 010	+ 998	- 934	- 033	- 042	+ 1.931	+ 175	306
12.	+ 001	+ 998	- 999	+ 013	- 022	+ 2.033	+ 157	246
13.	+ 012	+ 998	- 889	+ 105	- 509	- 0.283	- 433	1875
14.	+ 021	+ 998	- 603	+ 103	- 050	+ 0.569	+ 134	180
15.	+ 016	+ 998	- 803	+ 118	- 406	- 0.077	- 327	1069
16.	+ 020	+ 998	- 646	+ 117	- 129	+ 0.618	+ 212	449
17.	+ 021	+ 998	- 595	+ 171	- 096	+ 1.547	+ 045	20
18.	- 015	+ 999	- 815	+ 179	- 224	+ 1.754	- 074	55
19.	- 010	+ 999	- 929	+ 200	- 220	+ 0.040	- 133	179
20.	- 009	+ 999	- 940	+ 200	- 370	- 0.120	- 283	801

	α'	β'	c'	d'	n'	s'	v	vu
21.	+ 0.014 $d\lambda$	+ 0.999 $d\beta$	+ 0.842 dJ	- 0.072 df	- 0.010 = 0	+ 1.773	+ 0.121	0. 146
22.								
23.	+ 025	998	340	191	- 603	+ 0.951	- 476	2266
34.	+ 027	998	049	192	- 172	+ 1.094	- 057	32
25.	+ 026	998	267	192	- 083	+ 1.400	+ 040	16
26.								
27.	+ 024	998	449	193	- 583	+ 0.183	- 485	2352
28.	+ 027	998	006	193	- 518	+ 0.706	- 405	1640
29.	+ 020	998	637	193	- 055	+ 1.793	- 082	67
30.	+ 003	998	993	179	- 416	+ 1.757	- 263	632
	+ 000	998	- 1,000	126	+ 121	+ 0.245	- 197	388
31.								
32.	+ 020	998	640	106	- 155	+ 1.919	- 284	807
33.	+ 008	999	951	098	- 197	+ 0.351	- 271	734
34.	+ 009	999	941	098	- 069	+ 0.234	- 142	202
35.	+ 014	999	859	096	- 042	+ 0.292	- 117	137
	+ 015	999	829	095	- 166	+ 0.114	- 090	81
36.								
37.	+ 018	998	718	094	- 127	+ 0.519	- 208	433
38.	+ 019	998	686	094	- 215	+ 0.210	- 133	177
39.	+ 017	998	764	027	- 144	+ 1.608	- 021	4
40.	+ 018	999	734	081	- 135	+ 0.499	- 212	449
	+ 022	998	568	079	- 044	+ 0.575	- 127	161
41.								
42.	+ 025	998	373	078	- 005	+ 0.783	- 094	88
43.	+ 026	998	148	078	- 103	+ 0.851	- 007	0
44.	+ 026	998	108	078	- 111	+ 0.883	- 013	2
45.	+ 026	998	110	078	- 089	+ 1.123	- 017	3
	+ 025	998	334	078	- 135	+ 1.300	- 020	3

Lebenslauf.

Am 5. August 1882 als Sohn des Krankenpflegers Alois Völkel und seiner Ehefrau Klara, geb. Lorke, zu Breslau geboren, genoss ich meinen ersten Unterricht an einer hiesigen städtischen Elementarschule. Ostern 1893 bezog ich das hiesige Kgl. kath. St. Matthiasgymnasium, das ich 1902 mit dem Zeugnis der Reife verliess. Im April 1902 wurde ich bei der philosophischen Fakultät zu Breslau inskribiert und hörte Vorlesungen bei den Herren Professoren

Abicht, Baumgartner, Franz, London,
O. E. Meyer, Neumann, Pax, Rosanes und Sturm,
denen allen ich zu aufrichtigem Danke verpflichtet bin.

Seit August 1905 bin ich an der hiesigen Königl.
Universitäts-Sternwarte als Assistent angestellt.
